

第三章 檢討與建議

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 空氣品質監測作業

3.1.1.1 空氣污染物監測綜合檢討

本計畫依 83 年環境影響評估定稿報告內容做六輕廠區附近空氣品質監測計畫，自 83 年 4 月份起每季在三盛漁會(許厝寮測站)、麥寮中學及蚊港地區做連續十四天自動監測，本項監測已有五十七季連續監測記錄及施工前的背景監測記錄，自 88 年 4 月開始於麥寮中學、台西國中、土庫宏崙國小做每日逐時監測，以下就 97 年第二季(4~6 月)三測點各項監測結果做綜合檢討分析。

(一)麥寮中學

麥寮中學地理位置位於廠址地區正東邊，麥寮鄉的中部偏南方，由歷季的監測結果顯示懸浮微粒測值在每年的第四及隔年的第一季(秋、冬季)其測值都有偏高的現象發生，每年的第四季甚至到隔年的第一季測值偏高，經發現與當地的季風有明顯的關係，當冬季來臨時北方季風強盛，而麥寮地區位於濁水溪南岸，季風吹襲河岸砂地造成南岸後方飛砂走石。本季係屬春季監測，懸浮微粒測值 PM_{10} 最大日平均值 $125 \mu g/m^3$ 及 TSP 最大 24 小時測值 $189 \mu g/m^3$ ，本季 PM_{10} 計有 1 日有逾限空氣品質標準(空氣品質標準 $PM_{10}:125 \mu g/m^3$)之情形，測值較高原因係受氣候所影響。

SO_2 、 NO_2 及 CO 測值並未有超過標準值或異常值出現，每季監測都在一定範圍之內。

O_3 監測本季最大小時平均值 110ppb 符合空氣品質標準之情形(小時平均標準值:120ppb)。

非甲烷碳氫化合物及總碳氫化合物也列入本計畫監測項目中。本季空氣品質監測變化情形中二氧化硫及二氧化氮測值和歷季相當，從歷年空氣品質實測資料統計分析，以懸浮微粒及臭氧有超出空氣品質標準，懸浮微粒超出比率隨著當年度氣象狀況而變化，臭氧則以八小時平均值超出比率較

高。圖 3.1.1.1 為各季季平均與施工背景比較圖，圖 3.1.1.2 為自 88 年 4 月開始三測站各月月平均比較圖，圖 3.1.1.3 至圖 3.1.1.5 為各測站各項污染物 97 年度逐日平均值或 8 小時平均值變化圖。

*因應對策

為避免本計畫區附近空氣品質日漸惡化，針對造成懸浮微粒測值升高及揚塵問題於施工及運轉期間施工車輛往來之路段造成塵土飛揚時，其因應對策為道路經常灑水，路面經常清潔等，開發單位每日均有派人清掃廠區附近道路，相關執行情形結果均呈報至當地主管機關。

目前廠區除六輕四期外其餘已陸續興建完成，綠化面積增加裸露面積減少可有效減少揚塵，由於六輕廠區離人口聚集地較遠，各項污染物除少部份增加外其餘仍屬合理範圍之內。

(二)台西測站

台西測站位於廠區地理位置的南邊，經歷年五十七季的監測，TSP 最大 24 小時值計有 84 年第一季、85 年第一季、第四季、86 年第一季第四季、88 年第一季、第四季、89 年第一季、95 年第一季及第二季有逾現空氣品質標準值，經分析一、四季監測期間為 10 月至隔年 3 月東北季風屬強盛時期及偶有大陸沙塵暴的影響，測值於當年度屬偏高時期。

本季 PM_{10} 最大日平均值 $131 \mu g/m^3$ 有逾限空氣品質之情形計有 2 日有逾限空氣品質標準(空氣品質標準 $PM_{10}:125 \mu g/m^3$)之情形，TSP 最大 24 小時測值 $192 \mu g/m^3$ 符合空氣品質標準(空氣品質標準 $TSP:250 \mu g/m^3$)。

SO_2 、 NO_2 及 CO 歷季監測都符合環境品質標準值內並未有異常值出現， O_3 本季最大小時平均值 108ppb 符合空氣品質標準之情形(小時平均標準值:120ppb)。

O_3 八小時平均監測值在 83 年第二季、第四季、84 年第一季及 86 年第二季、第三季、第四季及 87 年第一季至第三季、89 年第一季、90 年第二季、91 年第二季至第四季及 92 年第二季、93 年第二季及第三季、94 年第二季及第三季、96 年第一季至 97 年第二季共計有 25 季中有部份月份超過標準值的現象發生，其原因以二次污染的機率相當高。

自 88 年 4 月開始本站由三盛測站移至台西測站作每日逐時監測，分析運轉前環保署台西測站及本計畫台西測站年度實測資料，施工前及運轉後和麥寮測站相同，臭氧測值部份時數有超出空氣品質標準之情形，圖 3.1.1.1 為各季季平均與施工背景比較圖，圖 3.1.1.2 為自 88 年 4 月開始三測站各月月平均比較圖。

(三)土庫測站

土庫測站位於廠區東南方位置，83 年第三季至 84 年第一季及 84 年第三季於海豐測點連續監測，自 84 年第四季起改為蚊港民宅測點，88 年 4 月改為土庫宏崙國小，該地點特性與麥寮中學測點相似屬於廠區東南方向，冬季第四季或第一季懸浮微粒較第二季與第三季有明顯偏高之趨勢，本季 PM_{10} 最大日平均值 $155 \mu g/m^3$ 有逾限空氣品質之情形，本季計有 2 日逾限空氣品質標準(空氣品質標準 $PM_{10}:125 \mu g/m^3$)之情形，TSP 最大 24 小時測值 $207 \mu g/m^3$ 符合空氣品質標準。

對於 O_3 監測小時平均值均符合空氣品質值標準值。八小時平均值計有 83 年第二季、85 年第三、四季、自 86 年第一季起至 88 年第一季、93 年第四季及 94 年第二季、第三季、96 年第一季至 97 年第二季其部份月份測值皆有大於環境品質八小時平均值標準 60ppb 的現象，本季中 1 月及 3 月八小時平均值均有大於空氣品質標準之情形。

圖 3.1.1.1 為各季季平均與施工背景比較圖，圖 3.1.1.2 為自 88 年 4 月開始三測站各月月平均比較圖。

3.1.1.2 FTIR 監測儀監測結果綜合檢討

FTIR 監測儀本季 97 年第二季監測於廠區行政大樓至塑化專保廠之間進行監測，經連續監測後所測出之物種計有一氧化碳、甲醇、氯乙烯、醋酸乙烯酯、氨氣、甲烷、乙烯、二氯甲烷等 8 種物質，本次監測期除 VCM 短時間有測值較高外，其他物種均未超限現象，下季持續監測。

3.1.1.3 監測結果異常現象及因應對策

表 3.1.1.1 上次監測異常狀況處理情形(97 年第 1 季)

測 站	異常情形	因應對策	執行成效
麥寮測站	本季懸浮微粒日平均值(PM ₁₀)計有 7 日(1/8~1/10、2/22、3/21、3/27、3/29)超出空氣品質標準(日平均標準值 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，主要受氣候所影響，當風速較低時(<1.0m/s)大氣擴散不良，測值明顯偏高。	本季懸浮微粒測值較高之時段，經觀察氣候變化，當空氣流動低時，測值有明顯上升之趨勢，尤其夜晚至凌晨時段海陸風交換期，測值較易偏高。	經持續監測，當風速風向變化大時，大氣流動良好，測值恢復正常已無異常值出現。
台西測站	本季懸浮微粒日平均值(PM ₁₀)計有 11 日(1/8、1/9、1/11、2/22、3/3、3/21、3/25~3/29)超出空氣品質標準(日平均標準值 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，主要係受東北季風及大氣擴散不良所影響。	本季懸浮微粒測值較高時段，經觀察氣候變化，其中 1/8、1/9、1/11、2/22、3/3 五日係受東北季風影響，3/21、3/25~3/29 六日為夜晚至凌晨時段海陸風交換期，空氣流動低，大氣擴散不良，測值較易偏高。當空氣流動大時，測值已有明顯下降。	經持續監測，當風速風向變化大時，大氣流動良好，測值恢復正常已無異常值出現。
土庫測站	本季懸浮微粒日平均值(PM ₁₀)計有 14 日(1/8~1/10、2/22、3/2~3/4、3/7、3/21、3/22、3/25、3/27~3/29)超出空氣品質標準(日平均標準值 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，主要係受東北季風及大氣擴散不良所影響。	本季懸浮微粒測值較高時段，經觀察氣候變化，其中 1/8~1/10、2/22、3/2~3/4 七日係受東北季風影響，3/7、3/21、3/22、3/25、3/27~3/29 七日為夜晚至凌晨時段海陸風交換期，空氣流動低，大氣擴散不良，測值較易偏高。當空氣流動大時，測值已有明顯下降。	經持續監測，當風速風向變化大時，大氣流動良好，測值恢復正常已無異常值出現。

表 3.1.1.2 本次監測異常狀況處理情形(97 年第 2 季)

測 站	異常情形	因應對策	執行成效
麥寮測站	本季懸浮微粒日平均值(PM ₁₀)計有 1 日(5/14)超出空氣品質標準(日平均標準值 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，主要係受氣候所影響。。	懸浮微粒測值較高時，經觀察氣候變化，當空氣流動大時，大氣擴散較好時測值已有明顯下降。	持續監測。
台西測站	本季懸浮微粒日平均值(PM ₁₀)計有 2 日(4/24、5/14)超出空氣品質標準(日平均標準值 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，主要係受氣候所影響。	懸浮微粒測值較高時，經觀察氣候變化，當空氣流動大時，大氣擴散較好時測值已有明顯下降。	持續監測。
土庫測站	本季懸浮微粒日平均值(PM ₁₀)計有 2 日(5/14、5/15)超出空氣品質標準(日平均標準值 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，主要係受氣候所影響。	懸浮微粒測值較高時，經觀察氣候變化，當空氣流動大時，大氣擴散較好時測值已有明顯下降。	持續監測。

圖 3.1.1.1 PM₁₀三測站各季季平均與施工前背景比較圖 (1/6)




圖 3.1.1.1 TSP三測站各季季平均與施工前背景比較圖 (2/6)




圖 3.1.1.1 SO₂三測站各季季平均與施工前背景比較圖 (3/6)




圖 3.1.1.1 NO₂三測站各季季平均與施工前背景比較圖 (4/6)




圖 3.1.1.1 CO 三測站各季平均與施工前背景比較圖 (5/6)




圖 3.1.1.1 O₃ 三測站各季平均與施工前背景比較圖 (6/6)




圖 3.1.1.2 PM₁₀三測站各月月平均比較圖 (1/6)




圖 3.1.1.2 TSP三測站各月月平均比較圖 (2/6)




圖 3.1.1.2 SO₂三測站各月平均比較圖(3/6)




圖 3.1.1.2 NO₂三測站各月平均比較圖(4/6)




圖 3.1.1.2 CO三測站各月平均比較圖(5/6)




圖 3.1.1.2 O₃三測站各月平均比較圖(6/6)




圖 3.1.1.3 麥寮測站97年SO₂逐日平均值及最大小時值變化圖(1/8)




圖 3.1.1.3 麥寮測站97年NO₂逐日平均值及最大小時值變化圖(2/8)




圖 3.1.1.3 參察測站97年CO最大小時值及8小時平均值變化圖(3/8)




圖 3.1.1.3 參察測站97年O₃最大小時值及8小時平均值變化圖(4/8)




圖 3.1.1.3 麥寮測站97年THC逐日平均值及最大小時值變化圖(5/8)




圖 3.1.1.3 麥寮測站97年NMHC逐日平均值及最大小時值變化圖(6/8)




圖 3.1.1.3 麥寮測站97年PM₁₀逐日平均值變化圖(7/8)




圖 3.1.1.3 麥寮測站97年TSP逐日平均值變化圖(8/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年SO₂逐日平均值及最大小時值變化圖(1/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年NO₂逐日平均值及最大小時值變化圖(2/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年CO最大小時值及8小時平均值變化圖(3/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年O₃最大小時值及8小時平均值變化圖(4/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年THC逐日平均值及最大小時值變化圖(5/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年NMHC逐日平均值及最大小時值變化圖(6/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年PM₁₀逐日平均值變化圖(7/8)




圖 3.1.1.4 台西測站97年TSP逐日平均值變化圖(8/8)




圖 3.1.1.5 土庫測站97年SO₂逐日平均值及最大小時值變化圖(1/8)




圖 3.1.1.5 土庫測站97年NO₂逐日平均值及最大小時值變化圖(2/8)




圖 3.1.1.5 土庫測站97年CO最大小時值及8小時平均值變化圖(3/8)




圖 3.1.1.5 參寮測站97年O3最大小時值及8小時平均值變化圖(4/8)




圖 3.1.1.5 土庫測站97年THC逐日平均值及最大小時值變化圖(5/8)




圖 3.1.1.5 土庫測站97年NMHC逐日平均值及最大小時值變化圖(6/8)




圖 3.1.1.5 土庫測站97年PM₁₀逐日平均值變化圖(7/8)





圖 3.1.1.5 土庫測站97年TSP逐日平均值變化圖(8/8)



3.1.2 噪音、振動及交通流量監測作業

本監測項目係針對六輕開發案廠區附近及其運輸道路敏感地區所選定之六監測點進行噪音及振動之監測作業，自 83 年開始執行監測作業以來目前已進入第十四年。前五年(83 年至 87 年)之監測為屬施工期間之環境監測作業，其重點在於瞭解及預防開發案施工過程對當地環境的影響衝擊，而自 89 年度開始，六輕部份專案工廠已逐步開車進入試運轉階段，本案的監測作業在環評時程中亦即進入所謂之六輕營運期間環境監測作業，其重點在於瞭解及預防工業區運轉對當地環境的影響衝擊。但由於整個六輕開發案現今尚有四期擴建計畫部份建廠工程仍在持續進行中，距全面正式營運仍有段時程，在這營運及建廠相互交錯的階段，為確保監測數據能適切的反應當地環境現況，目前測點位置仍延續先前施工期間所選定的地點，經由比對分析歷年所作之監測數據，更能真實反應出六輕進入運轉後當地環境的變化情況。

低頻噪音主要測定對象為娛樂營業場所、工廠、營建工程及住家冷卻水塔、抽風機及冷氣機之低頻噪音量，測量地點以陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面及其他只要反射面至少一公尺及離窗戶 1.5 公尺，所有測量位置皆距地面或樓板 1.2 至 1.5 公尺，門窗等開口部分需關閉。但本案監測地點南堤測點在南大門旁空地上，鄰近南環路。北堤測點在加設於工廠旁空地，鄰近東環路。其監測所得數值為廠房運作及車輛往來所產生的噪音值，其監測方法及地點對於環保署所公告之低頻噪音管制標準並不適用，所監測的數值大都逾於管制標準。

以下將針對本季各項目的監測結果，作一綜合檢討分析：

3.1.2.1 噪音監測結果綜合檢討分析

一、北堤

北堤測點係位於台塑六輕工業園區的右上方，旁臨台朔重工廠房，測點附近的道路是為從北方進入工業園區主要聯外道路，亦是六輕運輸車輛與工程車等重型車輛主要進出的門戶。設測點目的主要為監測六輕工業區北邊周界環境噪音現況，其主要噪音源除來自工廠機具運轉及施工工程的影響外，本測點附近道路車輛的通行有時亦會影響測值。北堤測點較以往施工期間所監測之位置稍有不同，先前測點位置較接近北堤入口警衛管制站旁，而目前此測點已移至廠區周界附近進行監測。本測點適用噪音管制標準中之工廠(場)噪音管制第四類標準。

北堤測點本季噪音 $L_{eq,24H}$ 值為62.9dB(A)，各小時均能音量值介於54.7dB(A)(22時至23時)~67.4dB(A)(07時至08時)之間，噪音最高值95.1dB(A)則出現於11時至12時。 $L_{\text{日}}$ 為64.5dB(A)， $L_{\text{晚}}$ 為55.9dB(A)， $L_{\text{夜}}$ 為59.0dB(A)，以上測值均符合噪音管制標準中之工廠(場)噪音管制第四類標準。與前季比較 $L_{eq,24H}$ 測值下降4.3dB(A)，三時段管制值亦呈現下降現象， $L_{\text{日}}$ 下降4.2dB(A)、 $L_{\text{晚}}$ 下降3.1dB(A)、 $L_{\text{夜}}$ 下降4.1dB(A)。本季監測時發現測點附近路面不平整以改善，導致車輛行經產生之噪音較為下降，根據交通流量數據顯示與上一季流量比較有名線的下降，本季噪音變化與交通流量有關;同時有相關之變化，已建請麥寮管理部注意道路之整補，將持續追蹤當地測值之變化。

北堤測點低頻噪音 $Leq,LF24H$ 值為54.0dB，各小時均能音量值介於40.5dB(A)(03時至04時)~58.0dB(A)(11時至12時)之間，噪音最高值81.0dB(A)則出現於11時至12時。 $L_{\text{日}}$ 為56.2dB(A)， $L_{\text{晚}}$ 為47.5dB(A)， $L_{\text{夜}}$ 為47.9dB(A)，以上測值均逾低頻噪音工廠(場)噪音管制標準之第四類標準。因測點位於東環路與北環路交叉口，其主要影響以交通車輛及廠房機器運轉，導致三測點均逾管制標準。

二、南堤

南堤測點設於台塑六輕工業園區右方周界，位於雲三之三道路進入工業區的入口處，其附近工業區的配置主要以行政區及

公園綠化區為主，因無大型生產工廠配置於此處，故此測點受工廠機具運轉所產生之噪音污染機會較少。隨一號聯外道路開通，測點附近雲三之三道路的交通流量隨之減少，惟影響本測點噪音測值最主要的因子仍為附近通行車輛所引起的交通噪音。此測點附近周圍並無居民居住，且離內陸700M以上，故對麥寮地區當地居民環境噪音影響實屬輕微，本測點適用噪音管制標準中之工廠(場)噪音管制第四類標準。

南堤測點本季噪音 $L_{eq,24H}$ 值為61.3dB(A)，各小時均能音量值介於52.9dB(01時至02時)~66.2dB(07時至08時)之間，噪音最高值89.4dB(A)則出現於16時至17時。 $L_{日}$ 為62.6dB(A)， $L_{晚}$ 為56.0dB(A)， $L_{夜}$ 為57.7dB(A)，以上測值均符合噪音管制標準中之工廠(場)噪音管制第四類標準。與前季比較 $L_{eq,24H}$ 值下降3.2dB(A)，三時段管制值則呈現波動情形， $L_{日}$ 下降2.9dB(A)、 $L_{晚}$ 下降2.2dB(A)、 $L_{夜}$ 下降0.2dB(A)。比對本季行經該處之車流，發現較前季減少，惟其減少部份大都發生在大型車及特種車，其對當地之噪音貢獻並非主要來源，故測值並未隨交通流量變動。將持續追蹤測值變化趨勢。

南堤測點本季低頻噪音 $Leq,LF24H$ 值為52.0dB，各小時均能音量值介於14.1dB(A)(05時至06時)~57.4dB(A)(10時至11時)之間，噪音最高值84.7dB(A)則出現於10時至11時。 $L_{日}$ 為54.3dB(A)， $L_{晚}$ 為42.6dB(A)， $L_{夜}$ 為44.6dB(A)，以上測值除 $L_{晚}$ 外其餘均逾低頻噪音工廠(場)噪音管制標準之第四類標準。測點位於南環路與南大門交界上，其主要影響為交通車輛及廠房機器運轉產生之噪音，導致產生逾管制標準情形發生。

三、橋頭國小

橋頭國小位於縣 154 道路旁，其道路附近有商店、市集等，故在環境噪音管制法中係屬商業及住宅使用之第三類管制區，本測點設立目的係監測經該管制區之縣 154 道路其交通噪音現況。由歷年監測資料顯示，噪音測值除部份受交通流量影響外，尚有受其他人為噪音干擾等特性存在，諸如附近商業活動與學生(橋頭國小)吵鬧聲之複雜音源為其影響噪音之音源，故當地噪音、振動測值之影響因子並非完全直接由經過車輛所造成。橋頭國小測點本季噪音 $L_{eq,24H}$ 值為70.1dB(A)，各小時均能音量值

介於 59.8dB(03 時至 04 時)~73.1dB(16 時至 18 時)之間，噪音最高值 102.4dB(A)則出現於 14 時至 15 時。 $L_{\text{早}}$ 為 68.6dB(A)， $L_{\text{日}}$ 為 71.8dB(A)， $L_{\text{晚}}$ 為 68.4dB(A)， $L_{\text{夜}}$ 為 64.3dB(A)，以上測值均符合道路交通環境音量第三類標準。與前季比較 $L_{\text{eq},24\text{H}}$ 值上升 3.5dB(A)，四項時段管制值 $L_{\text{早}}$ 上升 1.2dB(A)， $L_{\text{日}}$ 上升 3.8dB(A)， $L_{\text{晚}}$ 上升 3.8dB(A)， $L_{\text{夜}}$ 上升 2.5dB(A)。本季測值與上季差異不大，主要影響測值應以學生戶外活動時間較多影響，惟變化並不明顯，晚間時段仍受人為活動影響，噪音測值變化不大。

四、許厝分校

許厝分校測站位於許厝分校對面之民宅空地，臨縣 154 道路及雲三之 3 道路交匯點，主要是為監測交通噪音所設立，監測對象為縣 154 道路臨雲三之 3 道路交匯處，是一車道寬 3 米、路肩寬 1 米之雙向二線道路，依雲林縣政府公告噪音管制區分類係屬第三類管制區。本測點由過去監測資料顯示，因受測點旁邊養殖魚塭抽水馬達之運轉與因六輕施工所興起的商業活動影響，測點除有交通音源外，尚有其它人為性之干擾因子存在。

許厝分校本季噪音 $L_{\text{eq},24\text{H}}$ 值為 68.7dB(A)，各小時均能音量值介於 57.9dB(03 時至 04 時)~75.4dB(17 時至 18 時)之間，噪音最高值 101.7dB(A)則出現於 09 時至 08 時。 $L_{\text{早}}$ 為 67.0dB(A)， $L_{\text{日}}$ 為 70.6dB(A)， $L_{\text{晚}}$ 為 65.8dB(A)， $L_{\text{夜}}$ 為 61.8dB(A)，以上測值均符合道路交通環境音量第三類標準。與前季比較本季 $L_{\text{eq},24\text{H}}$ 值上昇 0.1dB(A)，四項時段管制值 $L_{\text{早}}$ 下降 1.1dB(A)、 $L_{\text{日}}$ 上升 0.4dB(A)、 $L_{\text{晚}}$ 下降 0.4dB(A)、 $L_{\text{夜}}$ 下降 1.7dB(A)。本季監測值與上季變動不大，參考交通流量變化亦不大，雖有當地路面不平整的現象，惟仍未逾管制標準，應不致對當地造成影響；將持續追蹤測值變化。

五、一號外道路豐安段

本測點因應一號聯外道路開通，六輕廠區車流分布移動之緣故，故將此測點移至一號聯外道路與後安村交會處，與交通流量測點相同，俾監控六輕廠區之車流對人口密集地區之影響程度。

一號外道路豐安段測點本季噪音 $L_{eq,24H}$ 值為 67.7dB(A)，各小時均能音量值介於 63.1dB(01 時至 02 時)~73.9dB(07 時至 08 時)之間，噪音最高值 100.9dB(A)則出現於 16 時至 17 時。 $L_{早}$ 為 68.3dB(A)， $L_{日}$ 為 68.9dB(A)， $L_{晚}$ 為 64.8dB(A)， $L_{夜}$ 為 64.7dB(A)，以上測值均符合道路交通環境音量第三類標準。與前季比較 $L_{eq,24H}$ 值持平，四項時段管制值亦同步呈現上升趨勢， $L_{早}$ 上升 0.5dB(A)、 $L_{日}$ 下降 0.5dB(A)、 $L_{晚}$ 上升 0.7dB(A)、 $L_{夜}$ 上升 3.4dB(A)。本季由於交通流量較前季略減，然大型車及特種車輛增加則較明顯，而夜間交通流量比日間較多故噪音值隨之上升；將持續追蹤本地測值變化趨勢。

六、西濱大橋

西濱大橋測點位於台 17 道及砂石場運輸道之交匯處，本測點主要為監測交通噪音，其中台 17 省道為一雙向四線，道路寬 18 米，路肩寬 2.5 米，車道寬 3 米道路。85 年第 2 季原選定之測點位置因受西濱大橋改建工程影響，道路封閉車流量急劇減少，已失去監測代表性，故將原測點往西濱大橋旁砂石車專用道移動，以監測重型工程車對當地之影響。此測點周圍除了砂石場外，其餘均為無人居住之農田地區，對於當地居民生活品質影響較小，依雲林縣政府公告噪音管制區分類本測點係屬第三類管制區。

西濱大橋測點本季噪音 $L_{eq,24H}$ 值為 66.0dB(A)，各小時均能音量值介於 54.6dB(01 時至 02 時)~70.6dB(17 時至 18 時)之間，噪音最高值 104.0dB(A)則出現於 10 時至 11 時。 $L_{早}$ 為 66.3dB(A)， $L_{日}$ 為 67.9dB(A)， $L_{晚}$ 為 59.8dB(A)， $L_{夜}$ 為 58.4dB(A)，以上測值均符合道路交通環境音量第三類標準。與前季比較 $L_{eq,24H}$ 值下降 3.8dB(A)，四項時段管制值 $L_{早}$ 下降 3.8dB(A)、 $L_{日}$ 下降 3.8dB(A)、 $L_{晚}$ 下降 3.3dB(A)、 $L_{夜}$ 下降 5.3dB(A)。本測點亦因交通流量略減及路面問題導致測值微幅下降，惟仍未逾管制標準，應不致對當地產生影響。

3.1.2.2 振動監測結果綜合檢討分析

一、北堤

北堤測點本季振動 $L_{v10(24H)}$ 值為 40.5dB，各小時振動均能值介於 30.2dB(22 時至 23 時)~40.5dB(13 時至 14 時)之間，振動最高值 57.4dB 則出現於 15 時至 16 時。 $L_{v10日}$ 測值為 42.7dB， $L_{v10晚}$ 為 30.7dB，兩者測值均符合參考管制標準第二種區域管制值。與前季比較 $VL_{10(24H)}$ 值下降 4.0dB， $VL_{10日}$ 下降 3.8dB， $VL_{10晚}$ 下降 7.0dB，變化趨勢與噪音及交通流量變化類似，顯示振動源與車流量之關係密切；本季測值並無大幅波動。

二、南堤

南堤測點本季振動 $VL_{10(24H)}$ 值為 46.5dB，各小時振動均能值介於 33.7dB(01 時至 02 時)~50.5dB(12 時至 13 時)之間，振動最高值 66.5dB 則出現於 12 時至 13 時。 $VL_{10日}$ 測值為 48.7dB， $VL_{10晚}$ 為 35.4dB，兩者測值均符合參考管制標準第二種區域管制值。與前季比較 $VL_{10(24H)}$ 值上升 8.3dB， $VL_{10日}$ 上升 9.2dB， $VL_{10晚}$ 持平，比對交通流量變化日間流量比夜間大故交通流量與本季測值變化有相關影響。

三、橋頭國小

橋頭國小測點本季振動 $L_{v10(24H)}$ 值為 36.6dB，各小時振動均能值介 31.8dB(02 時至 03 時)~40.8dB(12 時至 13 時)之間，振動最高值 66.9dB 則出現於 12 時至 13 時。 $VL_{10日}$ 測值為 37.6dB， $VL_{10晚}$ 為 34.5dB，兩者測值均符合參考管制標準第二種區域管制值。與前季比較 $VL_{10(24H)}$ 值下降 2.1dB， $VL_{10日}$ 下降 2.5dB， $VL_{10晚}$ 下降 0.8 dB，比對本季交通流輛發現大型車數量略減，使影響本季之振動值下降，將持續特別注意交通流量的變化。

四、許厝分校

許厝分校測點本季振動 $VL_{10(24H)}$ 值為 41.8dB，各小時振動均能值介於 35.9dB(01 時至 02 時)~42.9dB(13 時至 14 時)之間，振動最高值 64.2dB 則出現於 13 時至 14 時。 $VL_{10日}$ 測值為 43.0dB， $VL_{10晚}$ 為 39.2dB，兩者測值均符合參考管制標準第二種區域管制

值。與前季比較 $VL_{10(24H)}$ 值上升 0.8dB， $VL_{10日}$ 上升 0.1dB， $VL_{10晚}$ 上升 2.7dB，其變化趨勢略與噪音變化類似。

五、一號外道路豐安段

一號外道路豐安段測點本季振動 $VL_{10(24H)}$ 值為 47.3dB，各小時振動均能值介於 40.1dB(01 時至 02 時)~48.8dB(11 時至 12 時)之間，振動最高值 59.8dB 則出現於 06 時至 07 時。 $VL_{10日}$ 測值為 48.2dB， $VL_{10晚}$ 為 45.7dB，兩者測值均符合參考管制標準第二種區域管制值。與前季比較 $VL_{10(24H)}$ 值上升 1.0dB， $VL_{10日}$ 上升 1.4dB， $VL_{10晚}$ 上升 0.1dB，可看出交通流與噪音振動測值互動明顯，並未有測值逾限的狀況。

六、西濱大橋

西濱大橋測點本季振動 $VL_{10(24H)}$ 值為 44.7dB，各小時振動均能值介於 31.4dB(22 時至 23 時)~46.3dB(13 時至 14 時)之間，振動最高值 68.2dB 則出現於 11 時至 12 時。 $VL_{10日}$ 測值為 47.0dB， $VL_{10晚}$ 為 30.9dB，兩者測值均符合參考管制標準第二種區域管制值。與前季比較 $VL_{10(24H)}$ 值下降 2.2dB， $VL_{10日}$ 下降 1.9dB， $VL_{10晚}$ 下降 8.6dB，測值波動幅動不顯著，其與當地車流量變化有密切關係。

3.1.2.3 交通流量調查結果綜合檢討分析

本次調查監測作業係為施工期間第廿五次之監測，根據前一年度四季累積之背景資料，本季交通流量約略與之相當，以下將分別討論各測點變化情形。

一、北堤

北堤測點本季交通流量全日 TOTAL PCU 值為 8214.0，每小時小客車當量值最小為 42.5，發生時間為凌晨 02 時至 03 時，通行車輛有機車 4 車次、小型車 12 車次、大型車 4 車次及特種車 9 車次；最大值為 1114.0，發生時間為 19 時至 20 時，通行車輛有機車 150 車次、小型車 759 車次、大型車 75 車次及特種車 67 車次。

北堤出入口係六輕廠區運輸車輛及施工車輛之進出要道，隨著一號聯外道路通車之緣故，北堤車流亦隨之分散，不若施工及營運初期之負荷量；根據運輸研究所道路容量手冊之計算，本季北堤測點各方向之道路服務水準均維持在 A 級水準，與背景資料計算水準相當，顯示當地並無交通問題。

二、南堤

南堤測點本季交通流量全日 TOTAL PCU 值為 14559.0，每小時小客車當量值最小為 54.5，發生時間為凌晨 1 時至 2 時，通行車輛有機車 6 車次、小型車 40 車次、大型車 1 車次及特種車 4 車次；最大值為 2061.0，發生時間為上午 7 時至 8 時，通行車輛有機車 549 車次、小型車 1582 車次、大型車 58 車次及特種車 49 車次。

本測點位於六輕廠區堤大門口，緊臨行政大樓，原係各型進出廠區車輛必經之地點，惟隨廠區南北聯絡道之開通與廠門之增設，該地點之車流已漸形分散；由監測資料可看出，由南堤進出廠門的車輛已轉為以小型

車輛為主，大型車輛相對較少。本處道路係左右各二車道，足容量上下班之尖峰車流，故當地之道路服務水準亦均維持在 A 級，無任何壅塞的狀況發生。

三、橋頭國小

橋頭國小測點本季交通流量全日 TOTAL PCU 值為 19659.0，每小時小客車當量值最小為 206.0，發生時間為凌晨 2 時至 3 時，通行車輛有機車 42 車次、小型車 166 車次、大型車 10 車次及特種車 0 車次；最大值為 2004.5，發生時間為下午 19 時至 20 時，通行車輛有機車 618 車次、小型車 1607 車次、大型車 47 車次及特種車 9 車次。

本測點位於縣道 154 號，原係由台十七線方向進入六輕廠區必經之市集，人口較為稠密；道路因兩旁房屋密集，路肩寬度不足，極容易產生交通壅擠之狀況。本季交通流量較前季數值略降低，按道路服務水準計算，當地於上下班時段仍偶有出現 F 級水準；已建請麥寮管理部加強宣導員工上下班使用其他聯外道路，積極提升當地道路水準。

四、許厝分校

許厝分校測點本季交通流量全日 TOTAL PCU 值為 16777.5，每小時小客車當量值最小為 115.5，發生時間為凌晨 3 時至 4 時，通行車輛有機車 37 車次、小型車 84 車次、大型車 7 車次及特種車 1 車次；最大值為 1614.0，發生時間為下午 19 時至 20 時，通行車輛有機車 524 車次、小型車 1216 車次、大型車 51 車次及特種車 24 車次。

本處係雲三線與雲三之三線交會處，原亦為進出六輕廠區之交通要道，惟隨著南北聯絡道開通，此路線之原物料運輸車輛已逐漸減少，大抵餘上下班之小型車輛為大宗。本季測值與上季測值差略降，於上下班時段之道路服務水準會由 C 級升至 B 級，惟仍可維持在普

通水準，亦已建請麥寮管理部加強宣導員工上下班使用其他聯外道路，將持續追蹤當地測值變化。

五、一號聯外道路豐安段

一號聯外道路豐安段測點本季交通流量全日 TOTAL PCU 值為 20557.5，每小時小客車當量值最小為 158.5，發生時間為凌晨 3 時至 4 時，通行車輛有機車 43 車次、小型車 97 車次、大型車 10 車次及特種車 10 車次；最大值為 2266.5，發生時間為下午 19 時至 20 時，通行車輛有機車 444 車次、小型車 1611 車次、大型車 99 車次及特種車 114 車次。

本測點位於一號聯外道路與後安村交會處，由於一號聯外道路相當寬敞，自背景監測起即均維持在 A 級服務水準。本季於主線轉入中山支線路段，因路幅驟減，在上下班時段道路服務水準降至 C 級，惟仍可維持在普通水準故服務水準。

六、西濱大橋

西濱大橋測點本季交通流量全日 TOTAL PCU 值為 9189.0，每小時小客車當量值最小為 58.5，發生時間為凌晨 4 時至 5 時，通行車輛有機車 4 車次、小型車 13 車次、大型車 9 車次及特種車 12 車次；最大值為 1487.5，發生時間為下午 19 時至 20 時，通行車輛有機車 161 車次、小型車 1004 車次、大型車 102 車次及特種車 100 車次

本測點位於砂石專用道旁，為六輕北側主要聯外道路，原即供施工及砂石車輛行駛之用，現今亦為原物料運輸車輛之重要道路。砂石專用道鋪設亦頗寬敞，自背景監測以來即均維持在 A 級服務水準；本季監測與前季測值略微上升，主要因特種車流量增加，但道路水準亦均在 A 級服務水準。

3.1.3 地下水質監測作業

3.1.3.1 監測結果綜合檢討分析

- (1).麥寮工業區地下水之電導度、總溶解固體量、氯鹽及硬度等濃度均偏高，且含有海水成份之特性明顯，研判主要受到海水潮汐影響，此外因該工業區地質係抽砂填海造陸而成，海砂中原本即含有高濃度之鹽份，在受到地表入滲及海水潮汐影響下，造成地下水質變動大且不穩定。
- (2).麥寮工業區本為抽砂填海的新海埔地，與離島工業區外陸地淺層地下水型態有所差異，因此可能造成不同特性之水質。一般而言海岸砂洲地下淡水層將呈鏡狀體積懸浮於地下鹽水層上(地下水，1998)。
- (3).重金屬方面：銅、鋅、鉻、鎘、砷、鎳、汞仍在偵測極限以下或含量極低。而鐵、錳含量較豐之原因，經由歷年之調查可知，在本區主要由地質因素造成，但仍需持續監測追蹤。
- (4).麥寮工業區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游，因當地沖積扇內魚貝類及畜牧養殖業興盛，地下水質極易受到地表原有之魚塭、排水溝內之水體及防風林之有機肥影響，在藻類滋生、水體優養化及大量有機質入滲的情況下，容易造成氨氮檢測值偏高。
- (5).歷次麥寮工業區監測井在列管之有機化學物質方面檢驗結果均為偵測極限值以下，顯示目前該區地下水未受到列管有機化學物質污染。

3.1.3.2 監測結果異常現象因應對策

(1).上次監測之異常狀況及處理情形

上次監測結果不符合水質標準之監測井及項目，與往常相同，其異常狀況及處理情形簡要列於表3.1.3.1中。由本次檢驗報告與上次相比較改善程度並不明顯，許多異常狀況仍延續著改變不大。

(2).本次監測之異常狀況及處理情形

本次監測之異常狀況及處理情形簡要列於表3.1.3.2中，大致而言，檢驗結果與以往並無太大差異，為求掌握異常狀況及惡化水質是否獲得改善，有待持續監測。

(3).表3.1.3.3至表3.1.3.10為麥寮區監測井最近一年共五次之監測結果，並與環保署公告之地下水污染監測基準值之列表比對。

表 3.1.3.1 上次監測之異常狀況及處理情形 (97/1/24)

	異常狀況	因應對策	執行成效
總溶解固體量	#2、#5、#8、民1、民2 超過地下水監測基準值	繼續監測	繼續監測
氯鹽	#8、民1 超過地下水監測基準值	繼續監測	繼續監測
氨氮	#5、#8、民1、民2 超過地下水監測基準值	繼續監測	繼續監測
鐵	#5、民1、民2 超過地下水監測基準值	繼續監測	繼續監測
錳	#5、#7、#8、#11、民1、民2 超過地下水監測基準值	繼續監測	繼續監測
硬度	#5、民1、民2 超過地下水監測基準值	繼續監測	繼續監測

表 3.1.3.2 本次監測之異常狀況及處理情形 (97/4/10)

	異常狀況	因應對策與效果
總溶解固體量	#2、#7、民1、民2 超過地下水監測基準值	由於麥寮工業區地質係由抽砂填海造陸而成，因此地下水監測井水質容易受到海水、雨水入侵及附近地表舊有魚塭及排水溝內之水體所影響，故水質變化較大，容易有電導度、總溶解固體量及氯鹽偏高之現象，未來各井所測得之地下水水質是否會因雨水、河水等水團持續入滲，有待後續監測之檢驗分析。
氯鹽	民1、民2 超過地下水監測基準值	
氨氮	#5 超過地下水監測基準值	
鐵	#5 超過地下水監測基準值	
錳	#5、#8、#10、#11、民1、民2 超過地下水監測基準值	

表 3.1.3.3 #2 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	24.2	25.9	24.8	24.5	24.2
pH值	*	8.1	8.2	7.4	8.1	8.0
導電度 ($\mu\text{mho/cm}$)	*	2140	1760	2720	2700	2700
總溶解固體量(mg/L)	<1250	1700	1460	1260	1520	1590
濁度 (NTU)	<625	5.0	1.2	0.85	1.1	4.4
氯鹽 (mg/L)	*	696	504	384	513	522
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	140	138	170	157	222
硫化物 (mg/L)	*	0.07	ND	0.34	0.02	<0.020
氟鹽 (mg/L)	*	2.72	2.76	2.79	2.68	1.41
氨氮 (mg/L)	<0.25	0.04	0.13	0.05	0.04	0.08
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	0.20	0.24	0.17	0.24	0.36
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	<0.010	<0.0097	0.01	ND	<0.0020
無機氮含量 (mg/L)	*	0.24	0.37	0.23	0.28	0.44
總氮 (mg/L)	*	0.56	0.76	0.47	0.48	0.87
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	2.12	1.54	1.15	1.23	1.22
油脂 (mg/L)	*	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6
硬度 (mg/L)	<750	172	159	128	198	206
酚 (mg/L)	*	ND	0.0090	0.0089	0.0105	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	<0.0150	<0.0150	<0.0150	<0.0153
鉛 (mg/L)	<0.25	ND	ND	ND	ND	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.017	0.030	0.023	<0.0070	0.013
鉻 (mg/L)	<0.25	0.008	<0.0070	<0.0070	ND	<0.0070
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0089	0.0112	0.0167	0.0104	0.0098
鐵 (mg/L)	<1.5	0.211	0.112	0.062	0.032	0.104
鎳 (mg/L)	*	0.013	<0.0087	<0.0087	<0.0087	0.012
錳 (mg/L)	<0.25	0.282	0.127	0.038	0.017	0.203
汞 (mg/L)	*	<0.00045	0.0009	0.0011	0.0011	<0.0009
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.4 #5 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	25.5	25.3	24.1	24.3	24.0
pH值	*	7.9	7.3	7.5	7.6	7.1
導電度 (μ mho/cm)	*	5760	1690	1920	6060	5410
總溶解固體量(mg/L)	<1250	778	1970	712	4710	797
濁度 (NTU)	<625	11.2	6.5	2.6	27.0	13.0
氨鹽 (mg/L)	*	554	762	144	406	60.1
餘氨量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	157	170	112	215	153
硫化物 (mg/L)	*	<0.018	<0.02	ND	0.03	0.02
氟鹽 (mg/L)	*	0.30	0.28	0.80	0.17	0.27
氨氮 (mg/L)	<0.25	0.18	0.97	<0.023	1.83	0.52
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	3.50	2.77	0.34	0.09	0.12
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	0.028	0.333	0.57	0.03	0.01
無機氮含量 (mg/L)	*	3.71	4.07	0.91	1.95	0.65
總氮 (mg/L)	*	3.97	4.40	1.54	2.51	0.81
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	2.14	1.93	1.31	1.17	1.16
油脂 (mg/L)	*	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6
硬度 (mg/L)	<750	446	623	438	1020	509
酚 (mg/L)	*	<0.0080	0.0085	0.0089	<0.0080	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	ND	ND	ND	<0.0150	ND
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	ND	<0.0127	<0.0127	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.016	0.016	0.017	0.010	0.042
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	ND	ND	ND
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0030	0.0074	0.0013	0.0116	0.0104
鐵 (mg/L)	<1.5	0.955	1.46	0.105	1.62	2.07
鎳 (mg/L)	*	<0.0090	ND	ND	ND	0.019
錳 (mg/L)	<0.25	0.769	0.604	0.122	0.692	0.359
汞 (mg/L)	*	<0.00045	0.0009	0.001	0.0013	<0.0009
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.5 #7 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	23.5	24.3	24.7	24.6	25.1
pH值	*	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
導電度 (μ mho/cm)	*	2450	2500	3300	1590	2320
總溶解固體量(mg/L)	<1250	1560	3860	2180	698	1280
濁度 (NTU)	<625	9.3	16.0	16	4.0	1.1
氯鹽 (mg/L)	*	639	1720	865	167	360
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	118	183	127	85.6	101
硫化物 (mg/L)	*	ND	ND	ND	0.03	0.02
氟鹽 (mg/L)	*	0.26	0.24	ND	0.21	0.65
氨氮 (mg/L)	<0.25	1.25	2.20	0.52	0.15	0.10
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	2.13	2.37	0.77	2.95	1.03
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	0.017	0.923	1.32	0.03	0.01
無機氮含量 (mg/L)	*	3.40	5.49	2.61	3.13	1.14
總氮 (mg/L)	*	4.00	8.04	2.83	3.37	1.91
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	1.90	1.63	1.66	1.32	1.47
油脂 (mg/L)	*	0.1	0.5	0.6	0.6	1.1
硬度 (mg/L)	<750	470	793	632	425	307
酚 (mg/L)	*	<0.0080	ND	0.0099	<0.0080	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	ND	ND	<0.0150	<0.0153
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	ND	<0.0127	<0.0127	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.016	0.024	0.017	0.007	0.016
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	ND	ND	<0.0070
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0069	0.0154	0.0089	0.0026	0.0135
鐵 (mg/L)	<1.5	1.04	1.70	0.734	0.459	0.203
鎳 (mg/L)	*	<0.0090	<0.0087	ND	ND	0.072
錳 (mg/L)	<0.25	0.533	0.416	0.513	0.792	0.036
汞 (mg/L)	*	<0.00045	<0.0009	0.0011	0.0011	<0.0009
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.6 #8 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	23.4	24.3	24.1	24.3	25.4
pH值	*	7.4	7.2	7.5	7.1	7.0
導電度 (μ mho/cm)	*	4140	2930	3090	2490	1480
總溶解固體量(mg/L)	<1250	1260	4680	1620	1420	680
濁度 (NTU)	<625	3.4	9.7	10	6.3	9.4
氯鹽 (mg/L)	*	334	1400	675	884	44.4
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	193	146	93	81.2	175
硫化物 (mg/L)	*	0.02	ND	0.18	<0.02	<0.020
氟鹽 (mg/L)	*	0.66	0.27	ND	0.20	0.13
氨氮 (mg/L)	<0.25	0.12	2.23	0.29	0.58	0.18
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	0.31	3.04	0.34	2.36	1.80
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	<0.010	1.110	0.99	0.03	0.02
無機氮含量 (mg/L)	*	0.43	6.38	1.62	2.97	2.00
總氮 (mg/L)	*	0.74	9.41	1.66	3.23	2.55
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	1.87	1.93	1.27	1.27	1.50
油脂 (mg/L)	*	0.1	0.6	0.6	0.6	0.9
硬度 (mg/L)	<750	460	1070	440	582	437
酚 (mg/L)	*	ND	ND	0.0093	<0.0080	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	0.012	ND	<0.0150	<0.0153
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	<0.0127	<0.0127	ND	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.017	0.029	0.018	<0.0070	0.038
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	ND	ND	ND
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0014	0.0152	0.0078	0.0052	0.0078
鐵 (mg/L)	<1.5	0.086	2.40	0.600	0.573	1.01
鎳 (mg/L)	*	<0.0090	ND	0.016	ND	0.011
錳 (mg/L)	<0.25	0.175	0.403	0.260	0.752	0.929
汞 (mg/L)	*	<0.00045	0.0009	0.0011	0.0012	ND
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.7 #9 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	24.3	25.1	24.5	23.9	24.4
pH值	*	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3
導電度 (μ mho/cm)	*	1880	1540	1630	1850	1750
總溶解固體量(mg/L)	<1250	1700	1470	663	888	1010
濁度 (NTU)	<625	3.3	0.8	1.2	1.2	0.8
氯鹽 (mg/L)	*	490	356	85.1	185	117
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	203	226	61.6	71.6	279
硫化物 (mg/L)	*	0.05	ND	0.18	0.03	0.02
氟鹽 (mg/L)	*	0.50	0.59	ND	0.30	0.22
氨氮 (mg/L)	<0.25	0.07	0.15	0.03	0.05	0.11
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	0.48	0.84	0.97	0.79	1.18
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	ND	0.028	0.01	ND	0.01
無機氮含量 (mg/L)	*	0.55	1.02	1.01	0.84	1.30
總氮 (mg/L)	*	0.93	1.29	1.27	1.07	2.05
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	2.69	1.80	1.57	1.52	1.91
油脂 (mg/L)	*	0.2	0.8	0.9	1.0	1.0
硬度 (mg/L)	<750	550	539	358	441	491
酚 (mg/L)	*	ND	<0.0080	0.0115	<0.0080	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	ND	ND	ND	ND
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	ND	<0.0127	ND	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.025	0.039	0.055	0.021	0.018
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	ND	ND	<0.0070
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	<0.00055	ND	ND	<0.0011	<0.0011
鐵 (mg/L)	<1.5	0.048	0.038	0.046	0.031	0.041
鎳 (mg/L)	*	ND	ND	0.036	ND	0.047
錳 (mg/L)	<0.25	0.048	0.007	0.030	0.025	0.040
汞 (mg/L)	*	<0.00045	0.001	<0.0009	<0.0009	<0.0009
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.8 #10 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	26.0	23.9	24.2	23.8	24.3
pH值	*	7.4	7.2	7.2	7.6	7.3
導電度 (μ mho/cm)	*	5930	1390	1520	2340	2080
總溶解固體量(mg/L)	<1250	2760	918	4770	1190	1100
濁度 (NTU)	<625	14.7	2.1	15	1.4	1.4
氯鹽 (mg/L)	*	1480	163	2830	273	236
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	179	180	214	104	174
硫化物 (mg/L)	*	<0.018	<0.02	0.02	0.03	0.02
氟鹽 (mg/L)	*	0.34	0.37	ND	1.34	0.25
氨氮 (mg/L)	<0.25	2.00	0.08	0.09	0.03	0.07
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	0.50	1.50	0.36	0.54	1.17
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	0.011	0.072	1.36	ND	0.01
無機氮含量 (mg/L)	*	2.51	1.65	1.81	0.57	1.25
總氮 (mg/L)	*	3.18	2.08	2.11	0.91	1.98
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	2.50	1.50	1.35	1.32	1.41
油脂 (mg/L)	*	0.1	0.9	0.9	0.9	0.8
硬度 (mg/L)	<750	658	519	1010	331	457
酚 (mg/L)	*	ND	<0.0080	0.0110	ND	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	ND	<0.0150	<0.0150	<0.0153
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	ND	<0.0127	ND	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.013	0.020	0.029	0.013	0.024
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	<0.0070	ND	<0.0070
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0075	0.0020	0.0132	0.0047	0.0094
鐵 (mg/L)	<1.5	1.53	0.501	1.67	0.045	0.337
鎳 (mg/L)	*	ND	ND	0.184	<0.0087	0.010
錳 (mg/L)	<0.25	0.409	0.344	0.490	0.045	0.258
汞 (mg/L)	*	<0.00045	<0.0009	0.0009	<0.0009	<0.0009
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.9 #11 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	26.6	24.9	24.6	23.9	25.0
pH值	*	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
導電度 (μ mho/cm)	*	1140	1330	2120	1720	1410
總溶解固體量(mg/L)	<1250	1240	1070	1010	707	670
濁度 (NTU)	<625	7.1	3.3	1.1	11.0	3.7
氯鹽 (mg/L)	*	372	277	216	134	73.7
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	156	159	88.5	66.7	143
硫化物 (mg/L)	*	0.02	<0.02	0.04	0.3	0.11
氟鹽 (mg/L)	*	1.50	1.41	1.50	0.25	0.11
氨氮 (mg/L)	<0.25	0.09	0.11	0.04	0.11	0.10
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	2.22	1.56	0.70	2.99	1.05
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	0.018	0.020	<0.002	0.02	0.01
無機氮含量 (mg/L)	*	2.33	1.69	0.74	3.12	1.16
總氮 (mg/L)	*	2.52	2.02	0.98	3.22	1.75
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	1.93	1.43	1.27	1.55	1.45
油脂 (mg/L)	*	0.1	0.9	0.5	0.5	0.7
硬度 (mg/L)	<750	391	319	248	409	371
酚 (mg/L)	*	<0.0080	0.0080	0.0124	ND	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	ND	ND	ND	<0.0153
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	0.014	<0.0127	<0.0127	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.014	0.016	0.027	0.012	<0.0070
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	ND	ND	<0.0070
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0097	0.0064	0.0042	0.0022	0.0108
鐵 (mg/L)	<1.5	0.583	0.624	0.043	0.291	0.577
鎳 (mg/L)	*	<0.0090	<0.0087	0.041	<0.0087	ND
錳 (mg/L)	<0.25	0.580	0.447	0.007	0.762	0.328
汞 (mg/L)	*	<0.00045	<0.0009	<0.0009	0.001	ND
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

表 3.1.3.10 #12 井最近 5 次之地下水水質與監測基準值比較

分析項目	地下水污染 監測基準值	96/4/25	96/7/26	96/10/25	97/1/24	97/4/10
水溫	*	25.3	23.6	23.4	23.6	24.0
pH值	*	7.6	7.3	7.6	7.6	7.6
導電度 (μ mho/cm)	*	2130	1120	1150	1260	1490
總溶解固體量(mg/L)	<1250	853	779	383	375	674
濁度 (NTU)	<625	4	1	7.4	2	1.6
氯鹽 (mg/L)	*	181	130	39.6	75.4	116
餘氯量 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸鹽 (mg/L)	<625	177	139	30.9	128	102
硫化物 (mg/L)	*	0.03	ND	ND	0.03	<0.020
氟鹽 (mg/L)	*	0.37	0.32	ND	0.18	ND
氨氮 (mg/L)	<0.25	0.13	<0.023	0.08	0.03	0.07
硝酸鹽氮 (mg/L)	<25	0.10	0.44	0.19	0.05	0.11
亞硝酸鹽氮 (mg/L)	*	ND	<0.0097	0.01	ND	<0.0020
無機氮含量 (mg/L)	*	0.23	0.44	0.28	0.08	0.18
總氮 (mg/L)	*	0.24	0.70	0.51	0.25	0.42
氯乙烯單體 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
TOC (mg/L)	<10	1.43	1.17	0.72	0.79	1.16
油脂 (mg/L)	*	0.1	0.6	0.6	0.6	1.1
硬度 (mg/L)	<750	421	484	209	253	347
酚 (mg/L)	*	ND	<0.0080	0.0155	ND	ND
苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
乙基苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二甲苯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	<5	<0.015	ND	ND	<0.0150	<0.0153
鉛 (mg/L)	<0.25	<0.0127	ND	<0.0127	ND	ND
鋅 (mg/L)	<25	0.014	0.018	0.016	0.013	0.019
鉻 (mg/L)	<0.25	<0.0070	<0.0070	ND	ND	ND
鎘 (mg/L)	<0.025	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	<0.25	0.0016	0.0017	0.0059	0.0028	0.0101
鐵 (mg/L)	<1.5	0.122	0.571	0.389	0.070	0.091
鎳 (mg/L)	*	0.093	ND	ND	<0.0087	0.019
錳 (mg/L)	<0.25	0.247	0.124	0.312	0.082	0.210
汞 (mg/L)	*	<0.00045	ND	<0.0009	<0.0009	<0.0009
二氯乙烷 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
氯仿 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
二氯乙烯 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND
奈 (mg/L)	*	ND	ND	ND	ND	ND

3.1.4 海域生態調查監測作業

3.1.4.1 水文及水質化學

由本季調查結果與環保署所發布之「海域環境分類及海洋環境品質標準」相比較時，可發現本季14個測點於水質檢測項目均符合海域環境分類中為甲類海域及保護人體健康之海洋環境品質標準(表3.1.4.1.1)。而由本季與施工前同期(80年5月)水質調查作一比較(表3.1.4.1.2)，以及歷年來共計80次之水質調查作一比較(圖3.1.4.1.1)，亦可發現其間差異並不明顯。

3.1.4.2 海域底泥分析

由83年度至97年度於本季所做之沉積物採樣粒徑分佈分析結果(表3.1.4.2.1)，調查海域之沉積物主要是以0.000~0.062mm粒徑大小為主。而此區域於歷年度本季所做之底泥沉積物重金屬分析比較中(表3.1.4.2.2)，亦可發現各項重金屬分佈區間之差異並不明顯，整體而言，14年來於本海域所作之底泥分析調查結果其間變化並不明顯。

3.1.4.3 生物體重金屬分析

由83年度至97年度本季同期調查之生物體重金屬含量作一比較(表3.1.4.3.1)，以及歷年來共81次調查結果(圖3.1.4.3.1~圖3.1.4.3.4)顯示，可發現重金屬含量變化之情形並不明顯；而於歷年來共計81次之調查分析中，亦可發現銅之最高濃度大都出現在矛形梭子蟹，鉛的最高濃度則以矛形梭子蟹出現之頻率最多，鋅則是以鞋底魚有最高濃度出現，六價鉻之最高濃度則易出現於矛形梭子蟹(表3.1.4.3.2A)。至於銅最低濃度則最常出現於線紋玉螺，鉛之最低濃度則出現於長角仿對蝦，鋅之最低濃度則是出現於鼠銜魚中，六價鉻之最低濃度則亦於線紋玉螺中出現最多(表3.1.4.3.2B)，整體而言，由相同品種生物之重金屬檢測結果，大致可看出重金屬含量變化之情形並不明顯，且大致與生物品種有關。

表 3.1.4.1.1 六輕附近海域水質調查結果之分類比較

監測項目	九十七年六月(數據範圍)			海域環境分類 及海洋環境 品質標準	合格率(%)		
	遠岸區	近岸區	潮間帶		遠岸區	近岸區	潮間帶
溫度(℃)	28.3~28.6	28.2~28.5	28.2~28.4				
鹽度(psu)	33.1~33.6	33.2~33.4	33.1~33.4				
溶氧量(mg/L)	6.4~6.6	6.5~6.7	6.4~6.7	≥5.0	100	100	100
酸鹼度值	8.1~8.2	8.2	8.2	7.5~8.5	100	100	100
透明度(m)	1.8~2.0	1.6~2.0	1.6~1.7				
懸浮固體(mg/L)	4.2~8.6	4.6~19.2	6.9~20.5				
濁度(NTU)	3.3~6.2	3.7~14.0	5.4~14.0				
生化需氧量(mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	≤2.0	100	100	100
硝酸鹽(mg/L)	<0.042	0.046~0.051	0.045~0.054				
亞硝酸鹽(mg/L)	<0.0012	<0.0012	<0.0012				
磷酸鹽(mg/L)	<0.0015	<0.0015	<0.0015				
矽酸鹽(mg/L)	0.14~0.24	0.1~0.4	0.14~0.31				
總磷(mg/L)	0.01~0.02	0.02~0.041	0.014~0.034	≤0.05	100	100	100
葉綠素 <i>a</i> (μ g/L)	0.7~3.6	0.1~4.2	1.3~4.5				
總油脂(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5				
礦物性油脂(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	≤2.0	100	100	100
氨氮(mg/L)	0.04~0.07	0.05~0.11	0.06~0.12	≤0.3	100	100	100
大腸桿菌群 (CFU/100mL)	<10	20~25	<10	≤1000	100	100	100
酚(μ g/L)	<1.7	<1.7	<1.7	≤10	100	100	100
氰化物(μ g/L)	<0.63(MDL)	<0.63(MDL)	<0.63(QDL)	≤10	100	100	100
鐵(μ g/L)	4.9~9.4	4.7~12.1	4.5~12.1				
鉻(μ g/L)	<0.01	<0.01	<0.01				
鋅(μ g/L)	4.8~14	4.3~9.4	3.9~8.2	≤500	100	100	100
鎘(μ g/L)	<0.001	<0.001	<0.001	≤10	100	100	100
鉛(μ g/L)	1.5~2.6	<0.015	1.3~2.7	≤100	100	100	100
銅(μ g/L)	0.6~1.4	0.6~1.3	0.5~2.7	≤30	100	100	100
鎳(μ g/L)	0.6~1.4	0.6~1.0	0.6~1.2				
鈷(μ g/L)	<3.2	<3.2	<3.2				
砷(μ g/L)	<0.00014	<0.00014	<0.00014	≤50	100	100	100
汞(μ g/L)	<0.00015	<0.00015	<0.00015	≤2	100	100	100

註一：近岸區包括灰塘區(1D)及專用港域(1H)之水質調查結果。

表 3.1.4.1.2 97 年度第 2 季調查結果與本開發案施工前同期水質比較

監測項目	數 據 範 圍			
	本季水質調查結果		施工前同期水質調查結果	
	九 十 七 年 六 月		八 十 年 五 月	
	遠 岸 區	近 岸 區	遠 岸 區	近 岸 區
溫度(℃)	28.3~28.6	28.2~28.5	28.8 ~ 29.3	28.5~29.5
鹽度(psu)	33.1~33.6	33.2~33.4	34.6~34.8	34.7~34.8
溶氧量(mg/L)	6.4~6.6	6.5~6.7	6.3~6.5	6.3~6.4
酸鹼度值	8.1~8.2	8.2	8.1~8.2	8.1~8.2
透明度(m)	1.8~2.0	1.6~2.0	2.0~3.7	1.8~4.6
懸浮固體(mg/L)	4.2~8.6	4.6~19.2	12~18	12~16
濁度(NTU)	3.3~6.2	3.7~14.0	—	—
生化需氧量(mg/L)	<1.0	<1.0	0.9~1.9	1.5~2.0
硝酸鹽(mg/L)	<0.042	0.046~0.051	0.080~0.100	0.080~0.090
亞硝酸鹽(μg/L)	<0.0012	<0.0012	—	—
磷酸鹽(μg/L)	<0.0015	<0.0015	—	—
矽酸鹽(mg/L)	0.14~0.24	0.1~0.4	—	—
總磷(mg/L)	0.01~0.02	0.02~0.041	—	—
葉綠素 a(μg/L)	0.7~3.6	0.1~4.2	—	—
總油脂(mg/L)	<0.5	<0.5	0~2.0	0~1.0
礦物性油脂(mg/L)	<0.5	<0.5	—	—
氨氮(mg/L)	0.04~0.07	0.05~0.11	—	—
大腸桿菌群(CFU/100mL)	<10	20~25	—	—
酚(μg/L)	<1.7	<1.7	—	—
氰化物(μg/L)	<0.63(MDL)	<0.63(MDL)	—	—
鐵(μg/L)	4.9~9.4	4.7~12.1	—	—
鉻(μg/L)	<0.01	<0.01	—	—
鋅(μg/L)	4.8~14	4.3~9.4	9~25	8~31
鎘(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.05~1.28	<0.05
鉛(μg/L)	1.5~2.6	<0.015	<1~4	3~7
銅(μg/L)	0.6~1.4	0.6~1.3	2~14	2~6
鎳(μg/L)	0.6~1.4	0.6~1.0	—	—
鈷(μg/L)	<3.2	<3.2	—	—
砷(μg/L)	<0.00014	<0.00014	—	—
汞(μg/L)	<0.00015	<0.00015	—	—

註一：“—”表當次並未檢測該項目。

註二：近岸區包括灰塘區(1D)及專用港域(1H)之水質調查結果。

圖3.1.4.1.1A 海域水溫平均變化圖




圖3.1.4.1.1B 海域鹽度平均變化圖




圖3.1.4.1.1C 海域溶氧量平均變化圖




圖3.1.4.1.1D 海域酸鹼值平均變化圖




圖3.1.4.1.1E 海域透明度平均變化圖




圖3.1.4.1.1F 海域SS平均變化圖




圖3.1.4.1.1G 海域生化需氧量平均變化圖




圖3.1.4.1.1H 海域硝酸鹽平均變化圖




圖3.1.4.1.1I 海域亞硝酸鹽平均變化圖




圖3.1.4.1.1J 海域磷酸鹽平均變化圖




圖3.1.4.1.1K 海域矽酸鹽平均變化圖




圖3.1.4.1.1L 海域葉綠素a平均變化圖




圖3.1.4.1.1M 海域大腸桿菌群平均變化圖




圖3.1.4.1.1N 海域鉛平均變化圖




圖3.1.4.1.1O 海域銅平均變化圖




圖3.1.4.1.1P 海域銻平均變化圖




圖3.1.4.1.1Q 海域鉛平均變化圖




圖3.1.4.1.1R 海域銅平均變化圖




表3.1.4.2.1 歷年來本季各月份沉積物各區間粒徑大小超過20% 之主要組成成份分佈情形

採樣月份	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年
測站 優勢順序	4月	4月	4月	4月	4月	4月	4月	5月	6月	5月	5月	5月	5月	4月	6月
1A	1 >100	>60	>70	>140	>230	>140	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	>230
	2 >200	>100	>140	>70	>140	>230	>140	>140	>140	>70	>140	>140	>140	>140	>140
	3 >200	>200	>140	>70	>230	>140	>230	>230	>230	>70	>230	>230	>230	>230	>230
2A	1 <200	>60	>70	>140	>230	>230	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	<230
	2 >100	>100	>140	>70	>230	>140	>230	>230	>230	>70	>230	>230	>230	>230	<230
	3 >200	>200	>140	>70	>230	>140	>230	>230	>230	>70	>230	>230	>230	>230	<230
3A	1 <200	>200	>140	>140	>230	>230	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	<230
	2 >100	>100	>140	>70	>230	>140	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	<230
4A	1 >100	>60	>140	>140	>230	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	<230
	2 >40	>100	>70	>70	>140	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	<230
5A	1 <200	>100	>140	>70	>140	>230	>140	>140	>140	<230	>140	>140	>140	>140	<230
	2 >100	>100	>70	>140	>70	>140	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	<230
	3 >230	>230	>70	>140	>230	>140	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	<230
1B	1 >200	>100	>70	>70	>230	>230	>230	>230	>230	<230	>230	>230	>230	>230	>70
	2 >100	>40	>140	>140	>230	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140
2B	1 >40	>100	>70	>70	>140	>140	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	>140
	2 >60	>60	>35	>140	>230	>230	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	<230
3B	1 >100	>100	>70	>70	>230	>140	>230	>230	>230	<230	>230	>230	>230	>230	<230
	2 >40	>40	>140	>140	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	>230	<230
4B	1 >100	>60	>35	>35	>230	>140	>230	>230	>230	<230	>230	>230	>230	>230	<230
	2 <200	>100	>70	>70	>140	>230	>230	>230	>230	>140	>230	>230	>230	>230	<230
5B	1 >100	>40	>70	>70	>140	>140	>230	>230	>230	>70	>230	>230	>230	>230	>140
	2 <200	>100	>140	>140	>70	>230	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140
	3 >35	>35	>35	>35	>70	>230	>230	>230	>230	>70	>230	>230	>230	>230	>140
2C	1 >40	>100	>70	>70	>230	>230	>230	>230	>230	>70	>230	>230	>230	>230	<230
	2 <200	>40	>140	>140	>230	>140	>230	<230	<230	>140	>230	>230	>230	>230	<230
3C	1 >40	>0	>140	>70	>140	>230	>230	>230	>230	<230	>230	>230	>230	>230	>70
	2 >100	>100	>70	>140	>230	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140
	3 >60	>60	>70	>140	>230	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140	>140
1D	1								>140	<230	>140	>140	>140	>140	<230
	2								>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70
1H	1								<230	<230	<230	<230	<230	<230	>140
	2								>230	>35	>230	>230	>230	>230	>70

單位：mesh

表3.1.4.2.2 歷年來本季各月份麥寮附近海域採樣底泥沉積物重金屬含量之平均值

採樣日期/項目	Cu	Pb	Zn	Ni	Fe	As	Cd	Cr ⁶⁺	Hg
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppb
83年4月	10.0	18.1	63.0	26	3.00	13.3	0.04	18	18
83年5月	10.5	13.0	63.4	26	3.12	9.7	0.05	18	11
83年6月	9.9	12.0	59.9	25	3.00	8.3	0.04	17	11
84年4月	9.3	14.7	60.7	21	2.96	11.0	0.06	19	12
84年5月	8.2	11.6	57.2	20	2.78	13.9	0.04	17	12
84年6月	11.9	20.4	73.1	24	3.18	12.2	0.06	20	12
85年4月	7.5	11.4	62.4	23	2.52	12.5	0.03	14	10
85年5月	10.7	13.6	62.9	25	3.00	12.6	0.05	20	7
85年6月	9.8	12.7	70.7	25	2.80	9.9	0.04	18	23
86年4月	9.2	18.0	58.0	23	2.72	6.6	0.01	18	30
86年5月	14.2	20.7	70.1	27	3.14	7.2	0.01	22	38
86年6月	8.3	15.0	53.0	23	2.54	10.7	0.04	18	30
87年4月	8.2	13.6	61.5	21	2.54	10.7	0.04	16	16
87年5月	9.5	15.5	58.7	23	2.73	14.8	0.02	32	20
87年6月	11.7	14.6	61.2	24	2.72	11.0	0.03	18	36
88年4月	8.6	12.2	58.0	21	2.32	10.2	0.04	16	14
89年4月	11.3	14.1	59.1	23	2.34	9.9	0.03	26	13
90年5月	6.9	14.4	57.2	23	2.46	14.3	0.02	24	9
91年6月	10.4	13.6	62.8	22	2.38	11.6	0.08	18	17
92年5月	9.2	13.7	54.6	22	2.48	10.2	0.03	24	9
93年5月	24.6	25.1	85.8	28	3.28	12.4	0.07	29	43
94年5月	12.5	16.0	56.7	28	2.74	12.8	0.07	23	32
95年5月	13.7	16.9	67.0	33	3.05	13.1	0.05	24	42
96年4月	9.6	16.7	61.7	31	2.71	12.2	0.05	25	15
97年6月	11.2	17.4	65.4	33	3.09	11.7	0.07	26	26

表3.1.4.3.1 歷年來本季各月份麥寮附近海域生物體內重金屬採樣分析結果平均值

採樣日期/項目	銅(Cu)	鉛(Pb)	鎘(Cd)	鋅(Zn)	鎳(Ni)	鉻(Cr ⁶⁺)
83年04月	4.24	3.79	0.46	7.93		
83年05月	4.12	3.12	1.73	8.35		
83年06月	2.18	2.35	<0.01	5.25		
84年04月	1.06	1.14	0.01	4.01	<0.01	0.015
84年05月	1.00	1.13	<0.01	3.96	<0.01	0.017
84年06月	1.10	1.11	0.01	3.93	<0.01	0.019
85年04月	1.08	1.02	0.01	3.86	<0.01	0.012
85年05月	1.29	0.96	<0.01	4.05	<0.01	0.011
85年06月	1.09	0.70	<0.01	4.72	<0.01	0.011
86年04月	0.85	0.73	<0.01	4.04	<0.01	0.010
86年05月	0.61	0.43	<0.01	3.74	<0.01	0.009
86年06月	0.79	0.61	<0.01	4.15	<0.01	0.010
87年04月	1.39	0.61	<0.01	5.66	<0.01	0.009
87年05月	1.03	0.64	0.01	4.27	<0.01	0.010
87年06月	1.05	0.90	<0.01	2.69	<0.01	0.010
88年04月	1.39	0.74	<0.01	4.73	<0.01	0.009
89年04月	1.26	0.79	<0.05	5.33	<0.03	0.008
90年05月	1.22	0.90	<0.05	10.76	<0.03	0.008
91年06月	1.28	0.77	<0.05	9.35	<0.03	0.018
92年05月	1.31	0.75	<0.05	8.60	<0.03	0.012
93年05月	1.17	0.88	0.02	6.86	<0.03	0.011
94年05月	1.28	0.87	0.02	8.71	<0.03	0.010
95年05月	1.22	0.90	0.02	9.61	<0.03	0.010
96年04月	1.20	0.92	0.01	9.00	<0.03	0.011
97年06月	1.25	0.96	0.01	9.60	<0.03	0.013

單位：ppm

圖3.1.4.3.1 麥寮附近海域歷年來生物體內銅採樣分析結果變化圖




圖3.1.4.3.2 麥寮附近海域歷年來生物體內鉛採樣分析結果變化圖




圖3.1.4.3.3 麥寮附近海域歷年來生物體內鋅採樣分析結果變化圖




圖3.1.4.3.4 麥寮附近海域歷年來生物體內六價鉻採樣分析結果變化圖




表3.1.4.3.2A 歷次五種重金屬於不同種類樣品出現最高濃度之頻率

種類\項別	銅(Cu)	鉛(Pb)	鋅(Zn)	六價鉻(Cr ⁶⁺)
斑海鯰(含鼠銜魚)	17	6	4	16
舌鰨科	5	17	28	25
線紋玉螺	4	5	6	9
長角仿對蝦	8	7	20	15
矛形梭子蟹	47	42	9	26

表3.1.4.3.2B 歷次五種重金屬於不同種類樣品出現最低濃度之頻率

種類\項別	銅(Cu)	鉛(Pb)	鋅(Zn)	六價鉻(Cr ⁶⁺)
斑海鯰(含鼠銜魚)	19	5	42	19
舌鰨科	9	8	2	14
線紋玉螺	41	20	21	29
長角仿對蝦	8	42	3	16
矛形梭子蟹	3	4	8	10

3.1.4.4 浮游生物調查

歷年來本季本地區所作浮游植物調查結果比較中，有關浮游植物優勢種大致以金黃藻門矽藻綱佔絕大多數(表3.1.4.4.1)，由83~97年之調查可發現15年間調查結果之差異並不明顯。另對於83年度至97年度本季同期間浮游動物生體量及個體量等項目之調查結果比較中(圖3.1.4.4.1、圖3.1.4.4.2)，亦可發現15年間之差異並不大。

3.1.4.5 底棲生物調查

83至97年度本季同期於本區域所作之底棲生物採樣調查結果比較中，可發現亞潮帶及潮間帶所出現採獲密度、生物種類及平均歧異度間之差異並不明顯(表3.1.4.5.1)，至於出現之優勢種類，本年度亞潮帶之優勢種為櫻蛤科及簾蛤科，本年度潮間帶之優勢種則為歷年調查常出現之櫻蛤科、方蟹科及梭子蟹科為主(表3.1.4.5.2)。

另外在83年度至96年度同季於本區域所作之底棲生物拖網調查結果比較中，可發現97年度本季調查之數量—292隻，與歷年度同季調查之數量(83年：1,024~1,396隻、84年：1,281~2,292隻、85年：1,399~1,574隻、86年：914~1,165隻、87年：1012~1,629隻、88年：1,129隻、89年：706隻、90年：709隻、91年：452隻、92年：577隻、93年：399隻、94年：354隻、95年：330隻)比較(圖3.1.4.5.1)，其間差異並不明顯，至於調查出現之優勢種類則為角突仿對蝦、長角仿對蝦及台灣抱蛤等種類。

表3.1.4.4.1 歷年來本季各月份麥寮附近海域浮游植物調查出現之優勢種類

日期	A區(遠岸海域)		B區(近岸海域)		C區(潮間帶海域)	
	優勢種類	百分比	優勢種類	百分比	優勢種類	百分比
83年4月	<i>Trichodesmium thiebautii</i> (鐵氏束毛藻)	66.24%	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	87.00%	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	57.26%
83年5月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	41.69%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)		<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	28.93%
	<i>Rhizosolenia</i> sp. (根管藻)	15.21%	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)		<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	58.82%
83年6月	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	37.92%	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)		<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	30.59%
	<i>Trichodesmium thiebautii</i>	18.80%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)		<i>Trichodesmium thiebautii</i> (鐵氏束毛藻)	64.75%
84年4月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	17.74%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)		<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	12.60%
	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	13.88%			<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	11.81%
84年5月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	46.25%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)			
	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	17.46%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)		<i>Navicula</i> sp. (舟形藻)	31.96%
84年6月	<i>Nitzschia</i> sp. (菱形藻)	25.47%	<i>Nitzschia</i> sp. (菱形藻)		<i>Synedra</i> sp. (針杆藻)	31.24%
	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	18.81%	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)		<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	87.55%
85年4月	<i>Lauderis</i> sp. (勞德藻)	13.82%	<i>Lauderis</i> sp. (勞德藻)			
	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	11.64%				
85年5月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	48.80%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)		<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	45.90%
	<i>Rhizosolenia</i> sp. (根管藻)	10.05%			<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	34.43%
85年6月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	63.25%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)		<i>Pleurosigma</i> sp. (斜紋藻)	27.27%
					<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	27.27%
85年5月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	24.04%	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)		<i>Coccinodiscus</i> sp. (圓篩藻)	18.18%
	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	24.02%	<i>Lauderia</i> sp. (勞德藻)		<i>Diatoma</i> sp. (等片藻)	18.18%
85年6月	<i>Nitzschia</i> sp. (菱形藻)	12.47%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)		<i>Spirulina</i> sp. (螺旋藻)	63.79%
	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	34.12%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)		<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	20.79%
85年6月	<i>Rhizosolenia</i> sp. (根管藻)	20.65%	<i>Rhizosolenia</i> sp. (根管藻)		<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	15.24%
	<i>Nitzschia</i> sp. (菱形藻)	14.59%			<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	57.69%
					<i>Nitzschia</i> sp. (菱形藻)	11.54%

續表3.1.4.4.1

日期	A區(遠岸海域)		B區(近岸海域)		C區(湖間帶海域)	
	優勢種類	百分比	優勢種類	百分比	優勢種類	百分比
86年4月	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	30.34%	<i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	36.03%	<i>Navicula</i> sp. (舟形藻)	59.70%
	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	20.09%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	17.11%	<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	28.36%
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	17.78%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	12.97%		
86年5月			<i>Asterionella japonica</i> (日本星桿藻)	10.11%		
	<i>Nitzschia delicatissima</i> (柔弱菱形藻)	23.49%	<i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻)	23.36%	<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	58.65%
	<i>Stephanopyxis palmeriana</i> (掌狀冠蓋藻)	14.16%	<i>Nitzschia delicatissima</i> (柔弱菱形藻)	17.39%	<i>Navicula</i> sp. (舟形藻)	34.62%
	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	12.19%	<i>Nitzschia seriata</i> (成列菱形藻)	12.22%		
	<i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻)	10.63%				
86年6月	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻)	17.42%	<i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻)	15.92%	<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	84.78%
	<i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻)	17.05%	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻)	15.49%	<i>Nitzschia</i> sp. (菱形藻)	15.22%
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	16.81%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	15.25%		
	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	13.46%	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	11.29%		
	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	69.65%	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	26.55%	<i>Melosira</i> sp. (直鏈藻)	18.26%
87年5月					<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	12.77%
					<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	12.06%
					<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	10.99%
87年5月	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	69.55%	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	54.88%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	58.65%
			<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	12.89%	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	13.04%
					<i>Navicula</i> sp. (舟形藻)	10.87%
87年6月	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	48.43%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	46.71%	<i>Thalassiosira</i> sp. (海鏈藻)	50.00%
	<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	16.56%	<i>Thalassiothrix subtilis</i> (細弱海鏈藻)	11.74%	<i>Cyclotella</i> sp. (小環藻)	20.00%
			<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻)	10.93%	<i>Pleurosigma</i> sp. (斜紋藻)	10.00%
88年4月	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	31.44%	<i>Chaetoceros</i> sp. (角刺藻)	42.77%	<i>Coscinodiscus</i> sp. (圓篩藻)	66.66%
	<i>Trichodesmium</i> sp. (束毛藻)	27.30%	<i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	36.48%	<i>Biddulphia mobilensis</i> (活動盒形藻)	33.33%
	<i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	15.52%				

續表3.1.4.4.1

日期	A區(遠岸海域)		B區(近岸海域)		C區(潮間帶海域)	
	優勢種類	百分比	優勢種類	百分比	優勢種類	百分比
89年4月	<i>Thalassiosira hyalina</i> (透明海鏈藻) <i>Paralia sulcata</i> (具槽直鏈藻) <i>Chaetoceros</i> sp.(角刺藻)	16.50% 12.17% 10.69%	<i>Paralia sulcata</i> (具槽直鏈藻) <i>Thalassiosira hyalina</i> (透明海鏈藻)	18.98% 17.78%	<i>Rhizosolenia stolterfothii</i> (斯氏根管藻) <i>Pleurosigma</i> sp.(斜紋藻)	53.33% 13.33%
90年5月	<i>Hemiaulus sinensis</i> (中華半管藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	44.86% 12.77%	<i>Hemiaulus sinensis</i> (中華半管藻)	65.37%	<i>Prorocentrum micans</i> (海洋原甲藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Rhizosolenia styliformis</i> (筆尖根管藻) <i>Hemiaulus sinensis</i> (中華半管藻)	13.33% 30.23% 18.60% 10.23%
91年6月	<i>Chaetoceros lorenzianum</i> (洛氏角刺藻) <i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻)	33.30% 20.21%	<i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻) <i>Chaetoceros lorenzianum</i> (洛氏角刺藻)	41.01% 23.00%	<i>Chaetoceros lorenzianum</i> (洛氏角刺藻) <i>Rhizosolenia alata</i> (翼根管藻) <i>Chaetoceros</i> sp.(角刺藻)	25.52% 13.79% 10.00%
92年5月	<i>Rhizosolenia alata</i> (翼根管藻) <i>Rhizosolenia calcar</i> (距端根管藻) <i>Melosira granulata</i> (顆粒直鏈藻) <i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻)	32.42% 16.11% 14.67% 43.42%	<i>Rhizosolenia alata</i> (翼根管藻) <i>Melosira granulata</i> (顆粒直鏈藻) <i>Rhizosolenia calcar</i> (距端根管藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Rhizosolenia alata</i> (翼根管藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Biddulphia aurita</i> (長耳盒形藻)	43.27% 12.96% 11.43% 16.00% 15.36% 11.29% 20.55% 10.94% 10.66%	<i>Rhizosolenia calcar</i> (距端根管藻) <i>Guinardia flaccida</i> (萎軟幾內亞藻) <i>Rhizosolenia alata</i> (翼根管藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Thalassiosira frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻) <i>Rhizosolenia stolterfothii</i> (斯氏根管藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Thalassiosira</i> sp.(海鏈藻) <i>Thalassiosira hyalina</i> (透明海鏈藻)	18.85% 13.26% 11.63% 20.88% 17.46% 13.87% 18.67% 16.87% 15.06% 13.86%
93年5月	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻)	16.76%	<i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Thalassiosira frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻) <i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	35.49% 22.54% 12.28% 32.80% 10.13%	<i>Rhizosolenia stolterfothii</i> (斯氏根管藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Rhizosolenia styliformis</i> (筆尖根管藻) <i>Skeletonema costatum</i> (骨條藻)	18.67% 42.34% 34.23% 27.47% 12.91% 10.99%
95年5月	<i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻)	51.11% 10.59%	<i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Thalassiosira frauenfeldii</i> (伏恩海毛藻) <i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)	11.70% 8.83% 7.51% 6.08%	<i>Thalassiosira hyalina</i> (透明海鏈藻) <i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Leptocylindrus danicus</i> (丹麥細柱藻) <i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Skeletonema costatum</i> (骨條藻)	10.15% 9.34% 8.66% 7.76% 7.76%
96年4月	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Thalassiosira subtilis</i> (細弱海鏈藻) <i>Rhizosolenia styliformis</i> (筆尖根管藻)	20.62% 15.56% 10.87%	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻)			
97年6月	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻) <i>Rhizosolenia styliformis</i> (筆尖根管藻)	8.38% 8.17% 6.72%	<i>Lauderia borealis</i> (北方勞德藻) <i>Chaetoceros curvisetus</i> (旋鏈角刺藻) <i>Trichodesmium</i> sp.(束毛藻) <i>Rhizosolenia styliformis</i> (筆尖根管藻)			

圖3.1.4.4.1 歷年度本季麥寮地區浮游動物個體量比較圖




圖3.1.4.4.2 歷年度本季麥寮地區浮游動物生體量比較圖




表3.1.4.5.1A 歷年來本季各月份麥寮附近海域亞潮帶底棲動物之種類與其採獲密度(個/網)

月別	83.04			83.05			83.06			84.04			84.05			84.06		
種類	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	
Annelida (環形動物)																		
Polychaeta																		
Crustacea (節足動物)																		
Aceles sp.																		
Diogenes sp.	10.8	14.81%	7.1	14.85%		2.6	9.96%		0.1	0.37%		2.5	13.37%		2.7	13.30%		
Hippa sp.						0.2	0.77%					0.1	0.53%		0.1	0.49%		
Isopoda	0.1	0.14%							0.1	0.37%								
Leucosia cranioilaris									0.2	0.75%		0.3	1.60%		0.6	2.96%		
Matuta sp.	0.2	0.27%				0.1	0.38%											
Atajidae																		
Parapenaeopsis harchwickii	0.2	0.27%	0.1	0.21%		0.5	1.92%		0.1	0.37%		0.4	2.14%		0.4	1.97%		
Parapenaeopsis sculptilis			1.1	2.30%					0.4	1.49%								
Portunus hastatoides			0.2	0.42%		0.3	1.15%		0.4	1.49%		0.7	3.74%		0.7	3.45%		
Portunus hastatoides			1.2	2.51%					0.4	1.49%								
Squilla sp.	0.1	0.14%																
Coelenterata (腔腸動物)																		
Pennatulacea																		
Echinodermata (棘皮動物)	0.1	0.14%							0.1	0.37%								
Clypeastroides																		
Mollusca (軟體動物)																		
Clypeastroides																		
Chion sp.	1.4	1.92%							0.2	0.75%								
Circe sp.	0.7	0.96%	0.3	0.63%		0.7	2.68%		0.3	1.12%		0.8	4.28%		0.2	0.99%		
Corbula formosensis	13.7	18.79%	1.4	2.93%		6.0	22.99%		0.3	1.12%		1.8	9.63%		3.7	18.23%		
Cyclasunetta concinna	4.5	6.17%	13.8	28.87%		2.0	7.66%		5.3	19.78%		3.4	18.18%		2.3	11.33%		
Hastula sp.	0.6	0.82%	0.1	0.21%					0.2	0.75%								
Macoma sp.	19.2	26.34%				3.9	14.94%		4.9	18.28%		1.3	6.95%		1.8	8.87%		
Meretrix sp.	2.2	3.02%	2.5	5.23%		0.4	1.53%		0.4	1.49%		0.4	2.14%		0.8	3.94%		
Moerella sp.						0.4	1.53%		0.8	2.99%		0.2	1.07%		0.2	0.99%		
Natica lineata	0.9	1.23%	1.6	3.35%		0.2	0.77%								0.3	1.48%		
Neverita sp.	0.2	0.27%										0.2	1.07%					
Nitidotellina sp.									0.2	0.75%								
Phalium sp.	0.1	0.14%				0.5	1.92%		0.2	0.75%								
Reticunassa sp.	0.2	0.27%	2.7	5.65%		0.1	0.38%		0.4	1.49%		0.4	2.14%		0.5	2.46%		
Siliqua sp.						0.2	0.77%		0.2	0.75%								
Sinum sp.			7.1	14.85%		0.1	0.38%		0.8	2.99%		0.3	1.60%		0.4	1.97%		
Solidicorbula erythron			0.1	0.21%					0.4	1.49%								
Turridae															0.1	0.49%		
Umbonium sp.	9.6	13.17%	0.1	0.21%		2.9	11.11%		3.2	11.94%		1.5	8.02%		2.3	11.33%		
Zeuxis sp.	7.7	10.56%	5.3	11.09%		4.5	17.24%		1.7	6.34%		3.5	18.72%		2.5	12.32%		
Pisces (魚類)																		
Callionymidae																		
Cynoglossus sp.	0.3	0.41%	0.1	0.21%		0.3	1.15%		0.3	1.12%		0.5	2.67%		0.3	1.48%		
Trachinocephalus myops						0.2	0.77%		0.2	0.75%		0.2	1.07%		0.2	0.99%		
Total (總計)	72.9		47.8			26.1			26.8			18.7			20.3			
H' (政策度)	0.68		0.66			0.69			0.77			0.71			0.72			

續表3.1.4.5.1A

月別	85.04	85.05	85.06	86.04	86.05	86.06
種類	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比
Cocenterata (腔腸動物)						
<i>Pennatulacea</i>			0.1	0.51%		
<i>Actiniaria</i>						
Annelida (環節動物)						
<i>Polychaeta</i>		0.1	0.48%			
Crustacea (節肢動物)						
<i>Acetes</i> sp.	0.2	0.93%				
<i>Alpheus</i> sp.					0.2	0.83%
<i>Cherybdis</i> sp.			2.1	10.71%		
<i>Diogenes</i> sp.	2.3	10.65%			2.6	10.83%
<i>Dorippe</i> sp.	0.6	2.88%				
<i>Leptochela</i> sp.	0.6	2.88%	0.1	0.51%	0.3	1.25%
<i>Leucostea craniolaris</i>					0.3	1.25%
<i>Matuta</i> sp.	0.2	0.93%	0.3	1.44%	0.2	1.06%
<i>Parapenaeopsis cornuta</i>	0.4	1.85%	0.4	1.92%	0.4	2.12%
<i>Parapenaeopsis hardwickii</i>	0.6	2.78%	0.1	0.48%	0.2	1.06%
<i>Penaeus</i> sp.					0.1	0.42%
<i>Portunus hastatoides</i>	0.3	1.39%	0.5	2.55%	0.5	2.08%
<i>Rhizopinae</i>						
<i>Unknown (shrimp)</i>	0.1	0.46%				
Mollusca (軟體動物)						
<i>Gastropoda</i> sp.					0.2	0.83%
<i>Circe</i> sp.	1.4	6.48%	1.4	6.73%	2.2	11.64%
<i>Corbula formosensis</i>	1.9	8.80%	4.6	22.12%	4.8	20.00%
<i>Cyclosinetta concinna</i>	3.2	14.81%	2.8	13.46%	3.0	12.50%
<i>Hastula</i> sp.			0.6	2.88%	0.9	4.76%
<i>Macoma</i> sp.	3.0	13.89%	2.3	11.06%	4.7	24.87%
<i>Meretrix</i> sp.	1.7	7.87%	1.6	7.69%	3.2	16.93%
<i>Moerella</i> sp.					0.1	0.53%
<i>Natica lineata</i>	0.6	2.78%	0.5	2.40%	0.3	1.59%
<i>Neverita</i> sp.			0.9	4.59%	0.2	0.83%
<i>Nitidiotellina</i> sp.			0.1	0.51%		
<i>Reticunassa</i> sp.	0.4	1.85%	0.2	0.96%	0.4	2.12%
<i>Siliqua</i> sp.					0.2	0.83%
<i>Sinuni</i> sp.	0.3	1.39%	0.2	0.96%		
<i>Solidicorbula erythrodon</i>					0.4	2.12%
<i>Theora</i> sp.					0.4	2.12%
<i>Unbonimus</i> sp.	1.7	7.87%	0.7	3.57%		
<i>Zeuxis</i> sp.	3.0	13.89%	1.6	7.69%	2.9	12.08%
Pisces (魚類)						
<i>Callionymidae</i>	0.2	0.93%	0.1	0.48%		
<i>Chrysochir aureus</i>					0.1	0.53%
<i>Cynoglossus</i> sp.	0.1	0.46%	0.1	0.48%	0.1	1.59%
Sipunculoidea (星口動物)						
<i>Sipunculus</i> sp.					0.1	0.42%
總計 (Total)	21.6	20.8	19.6	18.9	24.0	15.0
歧異度 (H')	0.76	0.71	0.71	0.65	0.70	0.67

續表3.1.4.5.1A

月別	87.04			87.05			88.04			89.04			90.05			91.06		
種類	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	平均値	平均値	百分比	
Coelelenterata (腔腸動物)																		
Penantulea	0.2	0.60%	0.3	0.3	0.74%	0.3	0.3	1.20%										
Amelidae(環節動物)																		
Polychaeta																		
Crustacea (節肢動物)																		
Aceres sp.	0.3	0.91%	0.3	0.3	0.74%	0.7	0.7	2.80%							1.1	5.83%		
Alpheus sp.															1.3	5.65%		
Charybdis sp.															0.2	0.87%		
Diogenes sp.															1.3	2.61%		
Decapoda canaliculata	3.8	11.48%	3.6	4.0	8.91%	4.0	4.0	16.00%							0.6	1.82%		
Dordania crassimanus															0.4			
Dorippe sp.			0.3		0.74%													
Hippa sp.	0.1	0.30%	0.1	0.1	0.25%	0.1	0.1	0.40%										
Leucostea erantolaris																		
Lysmata sp.			0.2		0.50%													
Maja sp.			0.1		0.25%													
Matuta sp.	0.3	0.91%		0.2	0.80%	0.2	0.2	0.80%							1.3	5.65%		
Metapenaeus sp.															0.7	3.04%		
Parapenaeopsis cornuta	0.4	1.21%	0.7	0.5	1.73%	0.5	0.5	2.00%							0.6	2.73%		
Parapenaeopsis hardwickii	1.7	5.14%	2.6	0.3	6.44%	0.3	0.3	1.20%							0.8	3.18%		
Portunus hastatoides	0.5	1.51%	0.4	0.5	0.99%	0.5	0.5	2.00%							1.2	5.22%		
Portunus sanguinalentus			0.2	0.1	0.50%	0.1	0.1	0.40%							0.8	3.48%		
Rhizogonea			0.5		1.24%										0.8	4.55%		
Sicyopta cristata			0.4		0.99%										0.3	1.79%		
Squilla																		
Echinodermata(棘皮動物)																		
Ophiuroidea																		
Sinacanthocymus mai															0.2	0.87%		
Mollusca (軟體動物)																		
Babynia areolata	7.1	21.45%													0.6	2.61%		
Corbula																		
Gadilina coruscum																		
Meorella sp.	1.3	3.93%	1.0	0.4	2.48%	0.4	0.4	1.60%							0.9	3.91%		
Nassariidae	0.6	1.81%	2.0	0.3	4.95%	0.3	0.3	1.20%							0.3	1.30%		
Natica lueata	0.3	0.91%	1.4	0.2	3.47%	0.2	0.2	0.80%							0.5	2.17%		
Nituaellina sp.			0.7		1.73%													
Retemassa sp.			0.1	0.1	0.25%	0.1	0.1	0.40%										
Siliqua sp.			1.1		2.72%										0.3	1.79%		
Sinum sp.	0.1	0.30%	0.2		0.50%													
Solidicorbula erythraea	0.1	0.30%		0.1	0.40%	0.1	0.1	0.40%										
Tellinidae	8.3	25.08%	5.1	6.1	12.62%	6.1	6.1	24.40%							1.7	7.39%		
Turritella torbira																		
Trochidae	0.3	0.91%	1.4	0.5	3.47%	0.5	0.5	2.00%							1.2	5.22%		
Uvulidae	6.9	20.85%	4.1	2.7	10.15%	2.7	2.7	10.80%							5.5	23.91%		
Pisces (魚類)																		
Arius maculata				1	4.00%	1	1	4.00%							0.4	1.74%		
Callionymus lunatus	0.5	1.51%													0.6	2.61%		
Chrysoclitir aureus	0.2	0.60%																
Cynoglossus sp.			0.7	0.3	1.73%	0.3	0.3	1.20%							0.6	2.61%		
Leiogadlus splendens																		
Sectator racourius															0.5	2.17%		
Solea ovata			0.8		1.98%										0.2	0.90%		
Simunculoidea (原口動物)			0.3		0.74%													
總計 (Total)	33.1		40.4	25.0		22.0	23.0		18.6									
成年度 (H)	0.74		0.87	0.76		0.79	0.86		1.00									

續表3.1.4.5.1A

表43.1.4.3.1A												
月別	92.05		93.05		94.05		95.05		96.04		97.06	
	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比
種類												
Annelidat(蛭節動物)												
Polychaeta	0.2	0.37%	0.3	0.68%	0.6	2.36%	0.5	1.74%	0.4	1.39%	0.3	1.04%
Crustacea (節肢動物)												
Belomus triquus	0.2	0.37%										
Calappidae	0.7	1.29%	1.0	2.28%	1.3	5.12%	1.0	3.47%	1.8	6.25%	1.1	3.82%
Dioegidae	9.6	17.74%	6.6	15.03%	1.3	5.12%	2.8	9.72%	1.3	4.51%	2.4	8.33%
Dontoppe sp.	0.1	0.18%									0.7	2.43%
Helkea japonica	0.1	0.18%	0.7	1.59%								
Hippa sp.	0.1	0.18%										
Meliponensis sp.	0.2	0.37%	0.3	0.68%	0.2	0.79%	2.6	9.03%	0.2	0.69%	0.2	0.69%
Primadonidae					2.0	7.87%	3.5	12.15%	3.5	12.15%	3.6	12.50%
Paranidae	0.9	1.66%	2.4	5.47%	2.1	8.27%	3.5	12.15%	3.3	11.46%	3.8	13.19%
Pononidae	0.8	1.48%	2.7	6.15%	2.1	8.27%	2.1	7.29%	1.8	6.25%	1.7	5.90%
Sergestidae			4.8	10.93%	0.3	1.18%					0.3	1.04%
Sicyonidae												
Sirtella sinensis	0.2	0.37%	0.3	0.68%	0.2	0.79%	0.3	1.04%	0.2	0.69%		
Squillidae			0.2	0.46%								
Echinodermatata(棘皮動物)												
Arachnoides placenta	1.8	3.33%	1.3	2.96%	0.3	1.18%	0.4	1.39%	0.2	0.69%	0.3	1.04%
Ophiacanthidae											0.3	1.04%
Scaphellidae												
Sinacanthoquamus nani			1.3	2.96%								
Mollusca (軟体動物)												
Arctidae	10.4	19.22%	1.3	2.96%	0.1	0.39%	0.2	0.69%	0.2	0.69%	0.2	0.69%
Corbicidae					2.0	7.87%	1.3	4.51%	1.2	4.17%	1.2	4.17%
Dicathidae					1.0	3.94%	1.6	5.56%	1.3	4.51%	1.5	5.21%
Dicathidae	3.7	6.84%							0.3	1.04%		
Gomphina acquilata												
Moarella sp.	14.6	26.99%	3.6	8.20%	2.0	7.87%	2.1	7.29%	0.9	3.13%	1.5	5.21%
Nassariidae	11.3	20.89%	0.3	0.68%	1.8	7.09%	1.6	5.56%	1.4	4.86%	1.3	4.51%
Naticidae	1.3	2.40%										
Neritidae	0.5	0.92%	0.2	0.46%					0.2	0.69%		
Ocenebra												
Ocenebra												
Phidium decussatum	0.1	0.18%										
Phacops attenuatus	0.1	0.18%										
Sepidae					0.2	0.79%	0.3	1.04%				
Solanidae					0.4	1.57%	0.6	2.08%	0.7	2.43%	1.2	4.17%
Soridae					1.6	6.30%	2.4	8.33%	2.0	6.94%	4.2	14.58%
Tellinidae	3.1	5.73%	9.1	20.73%	1.6	7.87%	1.3	4.51%	2.0	6.94%	1.9	6.60%
Trachidae	0.1	0.18%	1.6	3.64%	2.0	7.87%	2.5	8.68%	2.5	8.68%	3.9	13.54%
Teneridae	2.9	5.36%	7	15.95%	2.9	11.42%						
Pisces (魚類)												
Apogonidae							0.5	1.74%				
Arius maculatus	0.3	0.55%	0.2	0.46%	0.4	1.57%	0.4	1.39%	0.5	1.74%	0.5	1.74%
Callionymidae												
Chrysoclinus aureus					0.6	2.36%	0.7	2.43%	0.6	2.08%	0.6	2.08%
Cynglossidae			0.2	0.46%								
Grammophilus scaber	0.1	0.18%							0.3	1.04%	0.3	1.04%
Leisopadidae												
Saurida elongata	0.2	0.37%										
Solidae	0.1	0.18%			0.4	1.57%	0.4	1.39%	0.4	1.39%	0.4	1.39%
Sparidae												
総計 (Total)												
	54.1		43.9		25.4		28.8		26.8		33.4	
岐異度 (H')												
	0.60		1.00		1.06		1.14		1.14		1.22	

續表3.1.4.5.1B

月別	85.04	85.05	85.06	86.04	86.05	86.06
種類	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比
Annelida (環節動物)						
<i>Polychaeta</i>	1.0	6.06%				
Crustacea (節肢動物)						
<i>Alpheus sp.</i>			0.5	1.64%		
<i>Amphipoda</i>	1.0	6.06%				
<i>Helice sp.</i>			1.0	5.71%	0.5	1.30%
<i>Heinigrapsus penicillatus</i>	1.0	6.06%	1.5	4.92%	2.5	6.94%
<i>Macrophthalmus abbreviatus</i>			0.5	1.64%		
<i>Macrophthalmus japonicus</i>			0.5	1.39%		
<i>Metopograpsus messor</i>					0.5	1.30%
<i>Asticris brevidactylus</i>	2.5	15.15%	4.5	14.75%	1.0	2.78%
<i>Pagurus sp.</i>			6.0	16.67%		
<i>Palaemon orientis</i>					11.0	28.57%
<i>Parasanna pictum</i>	4.0	24.24%	10.0	32.79%	5.5	15.28%
<i>Philyra pisum</i>			0.5	1.64%	1.5	4.17%
<i>Scopimera globosa</i>			0.5	1.39%		
<i>Uca sp.</i>						
Mollusca (軟體動物)						
<i>Cyclina sinensis</i>			1.5	4.17%	0.5	1.39%
<i>Latemula sp.</i>	3.0	18.18%	7.0	19.44%	3.5	20.00%
<i>Liza sp.</i>					3.0	7.79%
<i>Macra sp.</i>			2.0	5.56%		
<i>Meretrix sp.</i>			4.0	13.11%		
<i>Meretrix lusoria</i>			7.5	20.83%	1.5	8.57%
<i>Moerella</i>	4.0	24.24%	9.0	29.51%	11.0	28.57%
<i>Soletellina sp.</i>			0.5	1.39%		
Pisces (魚類)						
<i>Gobiidae</i>					1.5	3.90%
Total (總計)	16.5	30.5	36.0	17.5	38.5	18.5
H' (歧異度)	0.62	0.61	0.60	0.60	0.49	0.39

續表3.1.4.5.1B

月別	87.04	87.05	88.04	89.04	90.05	91.06
種類	平均値	百分比	平均値	百分比	平均値	百分比
Annelida (環節動物)						
<i>Polychaeta</i>	2.0	7.14%	0.5	1.79%	4.0	12.90%
Crustacea (節肢動物)						
<i>Acetes intermedius</i>					3.0	8.57%
<i>Alpheus</i> sp.					3.5	10.00%
<i>Ficus ficus</i>		2.50%			4.5	12.86%
<i>Gaetice depressus</i>					0.5	1.43%
<i>Heikea japonica</i>					2.0	5.71%
<i>Helice</i> sp.					1.5	5.66%
<i>Henigrapsus penicillatus</i>					3.5	13.21%
<i>Macrophthalmus banzai</i>					1.0	3.77%
<i>Metopograpsus messor</i>						
<i>Alictyris brevidactylus</i>	1.0	3.57%	0.5	1.79%	5.0	14.29%
<i>Parasesarma pictum</i>	8.0	28.57%	1.5	5.36%	2.5	7.14%
<i>Perisesarma bidens</i>	1.5	5.36%	4.5	16.07%	1.5	4.29%
<i>Philyra pisum</i>	1.5	5.36%	5.0	17.86%	1.5	4.29%
<i>Uca</i> sp.	1.5	5.36%	2.5	8.93%	2.5	7.14%
<i>Upogebia</i> sp.	0.5	1.79%				
Mollusca (軟體動物)						
<i>Batillaria zonalis</i>					0.5	1.89%
<i>Corbulidae</i>					3.0	8.57%
<i>Laternula</i> sp.	1.0	3.57%	3.5	12.50%	1.5	5.71%
<i>Littoraria</i> sp.	6.0	21.43%	1.0	3.57%	2.0	5.71%
<i>Moerella</i> sp.					1.0	3.77%
<i>Neverita vesicalis</i>					1.5	4.29%
<i>Tellinidae</i>	0.5	1.79%	6.0	21.43%	1.0	3.77%
<i>Veneridae</i>	3.5	12.50%	1.5	5.36%	6.0	22.64%
Total (總計)	28.0	40.0	28.0	31.0	35.0	17.5
H' (歧異度)	0.67	0.76	0.84	0.53	0.49	0.99

續表3.1.4.5.1B

月別	92.05	93.05	94.05	95.05	96.04	97.06
種類	平均值	百分比	平均值	百分比	平均值	百分比
Coelenterata (腔腸動物)						
<i>Pennatulacea</i>						
Annelida (環節動物)						
<i>Neanthes diversicolor</i>			1.0	3.45%		0.5 1.64%
<i>Polychaeta</i>						
Crustacea (節肢動物)						
<i>Aceles intermedius</i>	0.5	0.30%			0.5	1.64%
<i>Alpheus sp.</i>						
<i>Catappidae</i>			2.5	8.62%	2.0	6.56%
<i>Diogenidae</i>	0.5	0.30%	2.5	10.53%	1.5	5.17%
<i>Dorippe polita</i>			4.5	15.52%	4.5	15.52%
<i>Grapsidae</i>			3.5	12.07%	2.5	8.62%
<i>Mictyridae</i>			0.5	1.72%	0.5	1.72%
<i>Ocypodidae</i>					1.0	3.28%
<i>Parapenaeopsis hardwickii</i>	1.5	7.89%			1.0	3.45%
<i>Pectinidae</i>			2	10.53%	4.0	13.79%
<i>Portunidae</i>	0.5	0.30%			0.5	1.64%
<i>Sergestidae</i>						
<i>Typhlocarcinops takedai</i>	0.5	0.30%	1.0	3.45%		
<i>Neolithidae</i>						
Mollusca (軟體動物)						
<i>Batillaria zonalis</i>	157.5	93.20%				0.5 1.64%
<i>Corbulidae</i>			1.0	3.45%	2.5	8.62%
<i>Gerithiidae</i>					1.0	3.28%
<i>Laternula sp.</i>	0.5	0.30%				
<i>Littorinidae</i>			3.5	12.07%	2.5	8.62%
<i>Lucinidae</i>					4.5	14.75%
<i>Moricidae</i>	2.0	1.18%			0.5	1.64%
<i>Nassariidae</i>	2.5	1.48%	3.5	12.07%	3.0	9.84%
<i>Natica lineate</i>	1.0	0.59%			0.5	1.64%
<i>Neritidae</i>			2.0	6.90%	2.5	8.62%
<i>Neverita vesicalis</i>	0.5	0.30%			2.0	6.56%
<i>Tellinidae</i>						
<i>Terebridae</i>			0.5	1.72%	0.5	1.72%
<i>Thiaridae</i>			0.5	1.72%		
<i>Trochidae</i>			0.5	1.72%	1.0	3.45%
<i>Veneridae</i>	3.0	1.78%	3.5	12.07%	2.0	6.90%
Pisces (魚類)						
<i>Callionymus lunatus</i>			1.5	5.17%	1.5	4.92%
<i>Gobiidae</i>			0.5	1.72%	0.5	1.72%
Total (總計)	169.0	19.0	29.0	29.0	30.5	51.0
H' (歧異度)	0.37	0.89	1.07	1.11	1.09	1.30

表3.1.4.5.2A 歷年來本季各月份麥寮亞潮帶海域底棲動物出現之優勢種類及所佔比例

採樣月份	優勢種（百分比）	
83年4月	Tellinidae櫻蛤科(26.3%)	Corbulidae藍蛤科(18.8%)
84年5月	Veneridae簾蛤科(18.2%)	Nassariidae織紋螺科(18.7%)
	Diogenidae活額寄居蟹科(13.4%)	
85年5月	Corbulidae藍蛤科(22.1%)	Tellinidae櫻蛤科(13.5%)
	Diogenidae活額寄居蟹科(11.5%)	
86年5月	Veneridae簾蛤科(33.2%)	Corbulidae藍蛤科(12.8%)
	Diogenidae活額寄居蟹科(12.3%)	Nassariidae織紋螺科(12.3%)
	Tellinidae櫻蛤科(10.6%)	
87年5月	Corbulidae藍蛤科(20.3%)	Tellinidae櫻蛤科(12.6%)
87年6月	Corbulidae藍蛤科(23.9%)	Trochidae馬蹄螺科(11.0%)
	Diogenidae活額寄居蟹科(11.0%)	
88年4月	Tellinidae櫻蛤科(24.4%)	Corbulidae藍蛤科(21.6%)
	Diogenidae活額寄居蟹科(16.0%)	
89年4月	Veneridae簾蛤科(10.0%)	
90年5月	Veneridae簾蛤科(9.6%)	
91年6月	Diogenidae活額寄居蟹科(10.8%)	
92年5月	Tellinidae櫻蛤科(23.1%)	Nassariidae織紋螺科(17.8%)
	Diogenidae活額寄居蟹科(15.2%)	
93年5月	Tellinidae櫻蛤科(20.8%)	Diogenidae活額寄居蟹科(15.0%)
	Sergestidae櫻蝦科(11.0%)	
94年5月	Veneridae簾蛤科(11.5%)	
95年5月	Penaeidae對蝦科(12.2%)	Diogenidae活額寄居蟹科(9.6%)
96年4月	Portunidae梭子蟹科(12.7%)	Penaeidae對蝦科(12.4%)
97年6月	Tellinidae櫻蛤科(12.4%)	Veneridae簾蛤科(11.2%)
	Penaeidae對蝦科(10.9%)	Portunidae梭子蟹科(10.7%)

表3.1.4.5.2B 歷年來本季各月份麥寮潮間帶海域底棲動物出現之優勢種類及所佔比例

採樣月份	優勢種 (百分比)
83年4月 薄殼蛤 <i>Laternula</i> sp.(37.3%)	Ocypodidae 沙蟹科(10.2%)
Philyra pisum(10.2%)	
84年5月 Littorinidae 濱螺科(22.2%)	多毛類 Polychaeta(19.4%)
殼菜蛤 Mytilidae(19.4%)	Grapsidae 方蟹科(13.9%)
85年5月 Grapsidae 方蟹科(32.8%)	Tellinidae 櫻蛤科(11.3%)
86年5月 Palaemon orientis(28.6%)	Tellinidae 櫻蛤科(28.6%)
Grapsidae 方蟹科(19.5%)	
87年5月 Grapsidae 方蟹科(32.5%)	Mictyridae 和尚蟹科(21.3%)
Littorinidae 濱螺科(11.3%)	Tellinidae 櫻蛤科(11.3%)
88年4月 瑪珂蛤 <i>Macra veneriformis</i> (21.4%)	Grapsidae 方蟹科(17.9%)
Mictyridae 和尚蟹科(16.1%)	薄殼蛤 <i>Laternula</i> sp.(12.5%)
89年4月 Grapsidae 方蟹科(19.4%)	多毛類 Polychaeta (12.9%)
Sergestidae 櫻蝦科(12.9%)	平分大額蟹 <i>Metopograpsus messor</i> (11.3%)
90年5月 Grapsidae 方蟹科(14.3%)	多毛類 Polychaeta(12.9%)
Sergestidae 櫻蝦科(10.0%)	
91年6月 Grapsidae 方蟹科(13.2%)	Donippidae 關公蟹科(13.2%)
Veneridae 簾蛤科(13.2%)	
92年5月 Corbulidae 抱蛤科(93.2%)	
93年5月 Grapsidae 方蟹科(18.4%)	
94年5月 Littorinidae 濱螺科(12.1%)	Mictyridae 和尚蟹科(12.1%)
Veneridae 簾蛤科(12.1%)	Moricidae 結螺科(10.3%)
95年5月 Sergestidae 櫻蝦科(10.0%)	
96年4月 Grapsidae 方蟹科(24.6%)	Littorinidae 濱螺科(14.8%)
Mictyridae 和尚蟹科(11.5%)	
97年6月 Tellinidae 櫻蛤科(14%)	Grapsidae 方蟹科(9%)
Portunidae 梭子蟹科(9%)	

圖3.1.4.5.1 歷年本季麥寮附近海域拖網調查結果




表 3.1.4.1 上次監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
無	持續監測	本次監測結果持續無異常狀況發生。

表 3.1.4.2 本次監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策與效果
無	持續監測

3.1.5 陸域生態調查結果分析

本季（麥寮 97 年第二季）總共調查到野生動物 43 科 99 種，比上一季多 14 種，比 94 年同季多 7 種，比 96 年同季多 23 種，為同季歷來種數最多者。與之前記錄比較（67~88 種，11 季平均 82.5 種），本季創下動物調查種數新高記錄（圖 1）。

本季陸域動物生態監測於各調查樣區並未發現明顯因施工所造成之影響。調查期間為初夏氣候，氣溫逐漸升高，動物的活動增強。各類動物之狀況穩定良好。

本季調查資料分析如下：

3.1.5.1 哺乳類調查結果分析

本季（97年第二季）哺乳類共記錄到5科10種81隻。種數比上一季多1 種；比94年同季多2種；比96年同季多3種。與之前記錄比較（7~10種，11季平均8.4種），屬最佳狀況（圖2）。所有種類均屬數量普遍平地常見的種類。調查總隻數本季比上一季少11.8% ；比94年同季少42.6% ；比96年同季少40.9% 。

本季調查到的種類中，比上一季增加一種赤腹松鼠。調查時在許厝寮木麻黃防風林中見到2隻，且聽到其發出的鳴叫聲（參見照片）。

從優勢種來看，本季依遞減順序為：東亞家蝠、臭鼩、小黃腹鼠等。本季與上一季（東亞家蝠、小黃腹鼠、臭鼩）、94年同季（東亞家蝠、小黃腹鼠、臭鼩）相似；與96年同季（東亞家蝠、臭鼩、小黃腹鼠）之優勢順序相同。最優勢種東亞家蝠未改變。本季臭鼩之數量稍領先小黃腹鼠一點。

從特有性來看，本季觀察到的田鼯鼠（又稱月鼠）與小黃腹鼠為台灣特有種；台灣鼯鼠為特有亞種，均為歷來本地已有記錄者，本季仍然在調查區內活動。

本季未觀察到保育類野生哺乳動物，與之前相同。

本季哺乳類歧異度指數為0.39，比上一季的0.47低一點，比經過計算94年同季的數據所得的0.70低，比96年同季的0.72低，表示本季哺乳類優勢狀況集中於少數種的情形較上述三季不明顯。

綜觀本季哺乳類在種數、隻數、優勢組成方面均正常，狀況穩定良好。

3.1.5.2 鳥類調查結果分析

本季（97年第二季）鳥類共記錄到25科52種3965隻。比上一季減少2種。本季鳥種數比94年同季多16種，比96年同季多12種，為同季歷來最多。與之前記錄比較（34~54種，11季平均44.5種），為歷來種數次高者（圖3）。在調查總隻數方面，本季調查到的數量比上一季多26.6%；較94年同季增加198.1%，較96年同季增加128.7%。

本季觀察到的2種新記錄種有：中杓鵲，共6隻，屬數量普遍的冬候過境鳥，常成小群在海岸與附近環境出現（參見照片）；燕鷗，共2隻，屬數量不普遍的過境鳥，常成小群在海岸、沼澤等地出現）。

本季調查到的種類中，比上一季增加的10種為：栗小鷺、中杓鵲、白腰草鵲、小燕鷗、燕鷗、灰鵲鴿、藍磯鶇、黃頭扇尾鷺、尖尾文鳥、泰國八哥；比上一季減少的12種為：大白鷺、小水鴨、澤鵞、老鷹、紅隼、白冠雞、灰斑鵲、黃足鵲、小青足鵲、樹鵲、白腹鵲、爪哇八哥。

從居留性來看，本季調查到32種留鳥；比上一季的30種多2種；比94年同季的28種多4種；比96年同季的31種多1種，狀況大致相似。冬候鳥種共觀察到15種，較上一季少5種。夏候鳥記錄到3種：黃頭鷺（65隻，比上一季數量減少70.5%）、小燕鷗（3隻，上季無）、與家燕（353隻，比上一

季數量增加 161.5%)。觀察到籠中逸鳥 2 種 (泰國八哥與家八哥。

從優勢種來看，本季依遞減順序為：麻雀、白頭翁、家燕、褐頭鷦鷯、小白鷺、紅鳩、綠繡眼等；與上一季、94 年與 96 年同季狀況相似。

從特有性來看，本季共觀察到特有亞種 10 種，比上一季多 1 種；比 94 年同季 (11 種) 少 1 種；與 96 年同季 (10 種) 相同。

保育類動物本季共記錄到 2 種：珍貴稀有保育類的小燕鷗 3 隻 (上季無；參見照片)；與其他應予保育之野生動物：紅尾伯勞 2 隻 (較上季少 4 隻)。

本季鳥類歧異度指數為 0.18，與上一季的 0.17 相似，表示優勢狀況集中於少數種的情形與上一季類似。本季比經過計算 94 年同季的數據所得的 0.06 要高一點，表示本季優勢狀況集中於少數種的情形比較明顯一些；與 96 年同季的 0.12 相似，均屬優勢狀況集中於少數種的情形為甚不明顯者。

綜觀本季鳥類種數為歷來次高，隻數比之前同季都多，優勢狀況集中於少數種的情形甚不明顯，狀況良好。

3.1.5.3 爬蟲類調查結果分析

本季 (97 年第二季) 爬蟲類共記錄到 3 科 6 種 65 隻。種類數比上季多 4 種；與 94 年同季、96 年同季種數相同。與之前記錄比較 (0~8 種，10 季平均 5.7 種)，屬中高程度 (圖 4)。數量上比上季多 712.5%，比 94 年同季多 32.7%，比 96 年同季多 242.1%。

本季調查到的種類中，比上一季增加的 4 種為：守宮、中國石龍子、紅斑蛇、王錦蛇。

從優勢種來看，本季依遞減順序爲：守宮、蜥虎、印度蜓蜥，與上一季（蜥虎、印度蜓蜥）、94年同季（蜥虎、守宮）、96年同季（蜥虎、守宮）大致相似。

本季未觀察到保育類或特有種類之爬蟲。

本季爬蟲類歧異度指數爲0.39，比上季的0.78低，表示本季優勢集中於少數種類的情形較上季不明顯；比經過計算94年同季的數據所得的0.52稍低，顯示本季爬蟲類優勢狀況集中於少數種類的情形較其不明顯一點；與96年同季的0.33相近，表示本季爬蟲類的優勢狀況與其相似。

綜觀本季爬蟲類在種數、隻數上均高，狀況良好。

3.1.5.4 兩棲類調查結果分析

本季（97年第二季）兩棲類共記錄到3科6種147隻。種類數比上季多4種，比94年同季多2種，比96年同季多1種。與之前記錄比較（0~5種，10季平均3.1種），創下新高記錄（圖5）。本季兩棲類在數量方面比上季增加4800.0%，比94年同季多157.9%，比96年同季多133.3%。

本季調查到的種類中，比上一季增加4種；小雨蛙、美國牛蛙、貢德氏蛙、澤蛙。

從優勢種來看，本季依遞減順序爲：黑眶蟾蜍、澤蛙、小雨蛙；與上季（黑眶蟾蜍、拉都希氏蛙）、94年同季（黑眶蟾蜍、澤蛙）、96年同季（澤蛙、黑眶蟾蜍）均以黑眶蟾蜍爲主之狀況相類似。

本季觀察到珍貴稀有保育類的貢德氏蛙一種（參見照片）。
本季未觀察到特有種蛙類。

本季兩棲類歧異度指數爲0.24，比上季的0.56、經過計算94年同季的數據所得的0.47、與96年同季的0.38要低，表示本季兩棲類優勢狀況集中於少數種類的情形比上述3季不明顯。

綜觀本季兩棲類種數創新高，隻數增多，狀況良好。

3.1.5.5 蝶類調查結果分析

本季（97年第二季）蝶類調查共記錄到7科25種904隻。比上一季種數多7種；比94年同季少8種，比96年同季多7種。與之前記錄比較（8~33種，11季平均21.5種），屬中高程度（圖6）。在調查總隻數方面，本季比上一季多84.5%；比94年同季多18.0%；比96年同季多121.0%。

本季調查到的種類中，比上一季增加的8種為：大紅紋鳳蝶、玉帶鳳蝶、台灣黃蝶、台灣紋白蝶、紫斑蝶、琉球三線蝶、雌紅紫蛺蝶、尖翅褐弄蝶；比上一季減少的1種為：迷你小灰蝶。其中紫斑蝶與琉球三線蝶為新記錄種。



從優勢種來看，本季依遞減順序為：沖繩小灰蝶、紋白蝶、黃蛺蝶。與上一季的紋白蝶、沖繩小灰蝶、波紋小灰蝶，94年同季的沖繩小灰蝶、紋白蝶、波紋小灰蝶，96年同季的紋白蝶、沖繩小灰蝶、波紋小灰蝶大致相似，優勢種仍屬粉蝶科與小灰蝶科。



本季觀察到台灣特有亞種蝶類2種：江崎黃蝶與台灣紋白蝶。上一季僅觀察到一種江崎黃蝶；94年同季經清查原始資料發現僅記錄到一種台灣紋白蝶；96年同季觀察到江崎黃蝶與台灣紋白蝶2種，與本季相同。

如同上一季與94年和96年同季，本季未觀察到任何保育蝶類。

本季蝶類歧異度指數為0.29，比上一季的0.34稍低一點，表示本季蝶類優勢狀況集中於少數種的情形比較不明顯一些；比94年同季經過計算數據所得的0.09與96年同季的0.17高，表示本季蝶類的優勢集中狀況較上述二季明顯。

本季蝶類種數、隻數均明顯增加，狀況良好。





種數(種)




圖5 歷次兩棲類種類數統計表

種數(種)




圖6 歷次蝶類種類數統計表

3.1.5.6 植物生態調查結果分析

陸域植物生態調查範圍自濁水溪口以南至台西離島工業區以北之沿海地區，其環境型態包含潮間帶、防風林區、耕作區、養殖區與內陸地區等不同生態環境，並藉由選擇不同之植被類型進行監測，除了可瞭解當地植被情況外，並可探討各棲地受六輕廠區之影響。

監測樣區平均分散於雲林離島工業區域周邊各鄉鎮，主要採固定監測樣區進行，並參考歷來環境監測資料，進行相同季節物種及族群變化之比較。

本季調查中，各樣區上層植被，除了後安寮安東橋樣區無上層植株生長外，主要仍以木麻黃為主，其間並陸續衍生出數種天然次生林樹種，如黃槿、構樹、銀合歡、海欖果、水黃皮、苦楝、血桐、小葉桑、土密樹等，喬木樹冠層覆蓋度於本季調查並無明顯差異，但鄰近濱海地區之防風林可能因風力及鹽分的生長限制，導致現階段木麻黃防風林帶前段植株已呈現枯黃死亡的犧牲帶現象，其餘樣區上層植被均生長良好，且亦有新增之小植株的產生。

中低層植被類型在本季調查中，除海豐蚊港橋樣區因農民定期耕除現象，有明顯的人為干擾外，其餘樣區人為干擾現象本季調查都不明顯。

本季期間各樣區比對二季之物種組成後發現，植物組成仍多為近海平野常見種類，並以草本先趨物種為主。

由於時序進入夏季，氣候逐漸高溫雨量明顯增加，且濱海風力逐漸減弱造成下層植被族群大量拓殖的現象，原有濱海樣區下層植被裸露情形明顯改善。整體而言仍以單子葉植物(如牛筋草、狗牙根、孟仁草、紅毛草、龍爪茅、甜根子草)及部分雙子葉植物(如菊科大花咸豐草、豆科田菁、旋花科馬鞍藤)等族群佔有較大覆蓋面積，本季植物族群相較前季休眠黃化現象，已明顯進入萌芽拓展的階段。

整體而言，本季調查相較前季各區之主要優勢種類並無明顯更替情形，於目前階段植物生態並無嚴重干擾發生，且發育漸趨於穩定狀態，部份樣區優勢物種陸續穩定生長，佔據空間後減少地被的受光面積，因此林下無論是木本植物小苗或是較矮小之草本植物，其更新狀態皆較差。

本季調查於六個樣區內共記錄 39 科 95 屬 129 種植物，包含蕨類 2 科 2 種，雙子葉植物 31 科 99 種，單子葉植物 6 科 28 種，並無發現農委會公告之珍貴稀有保育類植物。

本季植物生態調查整體而言，延續歷來的調查可發現，上層植被組成於若非人為破壞短期內應不致有明顯改變。但在干擾度較低的地區，如許厝寮木麻黃防風林樣區，則陸續發展出天然次生林及灌木物種，已進入較為穩定的棲地發展狀態。

地被植物種類變化並不明顯，在進入夏季高溫多雨的氣候條件下，多數物種已脫離枯萎休眠期，進入大量萌芽族群拓展的階段，整體覆蓋情形相較前既有較明顯的差異。由於草本物種生長週期短，可快速進駐生長，因此可在短時間內造成大幅度的改變，但基於各樣區內之優勢植物皆為長時間競爭演替而來，且發育漸趨於穩定狀態，若非因人為干擾破壞，導致物種重新演替的現象外，應可視為季節性的週期變化。

本季調查多數下層植物種類已處於萌芽族群拓展期，灌木類如鯽魚膽，草本類如田菁、大花咸豐草、馬鞍藤、菟絲子、甜根子草、孟仁草、紅毛草、象草、巴拉草、蘆葦、葎草、槭葉牽牛、馬齒莧等，均呈現大面積生長狀況，在比對二季物種之後，發現本季物種無明顯變化。

因應比對長期監測資料的正確性及可信度，本季植物生態調查比較分析部分，仍針對歷來比較之許厝寮木麻黃防風林樣區、後安寮安東橋樣區、海豐蚊港橋樣區等三個監測樣區進行比較。

一、植被組成

(一) 許厝寮木麻黃防風林樣區 (Plot I)

本監測樣區木麻黃防風林栽植已相當長的一段時間，木麻黃純林植株及覆蓋度均較高，樣區並非緊鄰海濱，林下有許多長年積水渠道，是不錯的生長環境。

※與上季比較

本季已逐漸進入夏季高溫多雨的氣候，且在濱海風力逐漸減弱條件下，積水渠道水位較前季明顯上升，濱水性植栽覆蓋率增加，但上層植被木麻黃防風林狀況覆蓋程度變化不大。原有裸露地區已由低層植被重新覆蓋生長，裸露現象明顯降低，次生林如銀合歡、水黃皮、構樹、黃槿、海欖果，及鯽魚膽、臭娘子等低矮灌叢之天然中層植被結構生長狀況良好，但仍處於休眠狀況，未見族群擴增現象。

由於水量明顯增加且氣候條件已明顯回暖，水濱植被如蘆葦、巴拉草、水生黍等物種因水量增加，相較前季族群覆蓋率已明顯增加。低層植被族群已進入萌芽族群拓展期，主要仍以禾本科狗牙根、狗尾草、菊科大花咸豐草等植物族群為主，大戟科大飛揚、西番蓮科三角葉西番蓮、瑞香科南嶺堯花仍呈現少量散生於林下現象，整體覆蓋情形相較前季更加良好。

※與去年同季比較

相較去年同季，上層植被並無明顯變化，呈現穩定成長狀況，中層植被陸續演替出的銀合歡、水黃皮、構樹、黃槿、海欖果的次生林，生長繁衍狀況良好。相較於去年同季明顯的人為干擾現象，今年並無人為干擾現象，且在水量明顯增加且氣候明顯回暖條件下，低層植物族群拓展情形明顯增加，覆蓋程度明顯改善，主要仍以禾本科狗牙根及菊科大花咸豐草等族群有較大面積拓殖的現象，水濱植被如蘆葦、巴拉草、水生黍等物種亦因水量較去年同季增加，族群明顯恢復。

（二）後安寮安東橋樣區（Plot II）

本監測樣區整體區域未見喬木物種，但草本物種覆蓋度良好，僅樣區週邊有零星人爲干擾的痕跡，情況並不嚴重，現況保持草澤類型的植被狀況。

※與上季比較

本區並無上層植被光線充足，區域內仍維持上季以禾本科蘆葦及巴拉草爲優勢物種草澤型態，族群佔樣區整體面積 80% 以上，整體區域仍延續前季不見喬木物種，草本物種覆蓋度良好，植物族群生長情形穩定。

本季已逐漸進入夏季高溫多雨的氣候，且在濱海風力逐漸減弱條件下，相較前季黃化枯萎現象，植物族群已呈現明顯發芽及族群拓展的現象，次生的木本植物如菊科鯽魚膽呈現萌芽成長狀態，蘆葦及巴拉草等植物群落亦見明顯增生萌芽現象，其他適應較乾燥環境先趨物種如菊科大花咸豐草、醴腸、禾本科雙穗雀稗、狗牙根、牛筋草等前季有明顯較大族群生長的物種，整體族群相較前季覆蓋面積有明顯增加現象。

※與去年同季比較

相較去年的資料，本區植被種類並無過大的變動，但木本植物族群及適應較乾燥環境先趨物種族群卻較去年同季來的更多，大戟科土密樹、篋麻之少量苗木仍持續生長，在氣候條件適於生長且人爲干擾因素不大的狀況下，顯示樣區內植栽已漸次進入演化的階段，本樣區將逐漸由陸生性較強的物種族群取代，並發展出木本植物族群。

（三）海豐蚊港橋樣區（Plot III）

本監測樣區爲廢耕農田，但農民仍會定期耕除並播灑綠肥植物，因此定期人爲干擾的效應嚴重。

※與上季比較

本區邊緣地帶可見以木麻黃純林爲主的上層植被，因屬農田邊緣地帶，長期均未遭受人爲干擾狀況穩定，木麻黃純林外圍有大量菊科鯽魚膽出現。低層植被據現況推測本季農田明顯由農民翻土並播灑綠肥植物，土壤明顯較前兩季鬆軟且裸露情形嚴重，其上可見大量的豆科田菁苗木生長，原有禾本科蘆葦、孟仁草、升馬唐、牛筋草、龍爪茅、甜根子草、狗尾草、莧科野莧、藜科臭杏、蒺藜科蒺藜、莎草科密穗磚子苗、磚子苗、大戟科大飛揚、旋花科銳葉牽牛、馬鞭草科過江藤，多數呈現族群大量減少狀況，相較前季有較明顯的差異，整體而言覆蓋程度因人爲干擾產生較大變化。

※與去年同季比較

本區相較去年同季之資料，物種仍爲先趨物種或綠肥植物多數雷同，並無明顯的植物演替現象，推測可能因長年有人爲干擾現象，每次耕除清理經過一段時間的演替之後，草本物種自由的入侵進駐，導致整體區域少見木麻黃純林以外的上層植被物種，出現的物種變化不大，植物演替的效應不明顯。

二、植被分佈類型

(一)防風林

廠址以外區域包括濁水溪南岸之海岸砂丘、田埂、公路，均以人工栽植防風林帶，包括有第一階段人工造林木麻黃林木，及第二階段人工造林的黃槿植栽。

濱海邊緣地帶因嚴重的風害及海風鹽份，生長條件較嚴苛，木麻黃防風林帶植株較小，且前段植株已呈現枯黃死亡的犧牲帶現象。低層植被主要物種以旋花科馬鞍藤覆蓋面積最大，菊科大花咸豐草、禾本科牛筋草、旋花科菟絲子亦有大面積的生長，在裸露的地區已陸續可見禾本科孟仁草、龍爪茅、甜根子草、巴拉草、馬齒莧科馬齒莧、豆科田菁、大戟科台西

大戟、藜科變葉藜等物種出現。

在較內陸的木麻黃防風林植株高大且覆蓋度較高，周邊並伴生銀合歡、水黃皮、構樹、黃槿、海欖果的次生林，及鯽魚膽、臭娘子等低矮灌叢之天然中層植被結構，長年水道旁發展出如蘆葦、巴拉草、水生黍等親水性較高之物種，低層植被結構主要以禾本科狗牙根為主，僅偶可見菊科大花咸豐草、大戟科大飛揚、禾本科狗尾草、西番蓮科三角葉西番蓮等散生於林下，植群生長穩定。

(二)草生地

臨濁水溪南岸區目前仍有許多的草生地，分佈在公路兩側周邊，因日照充足地區乾燥，各種先驅性的陽性物種紛紛進駐，上層植被類型主要生長於較高之砂石丘上，以銀合歡、構樹為主，但高度多在 2 公尺左右的小型植株，其間夾雜有少數的木麻黃、血桐。

由於長年強風吹襲，草本物種主要以陽性的先驅種類為主，主要以旋花科馬鞍藤、菊科大花咸豐草、加拿大蓬、豆科田菁、禾本科孟仁草、紅毛草、龍爪茅、狗尾草覆蓋面積最大，其間並夾雜有豆科含羞草、禾本科甜根子草、大黍、茜草科雞屎藤等植物。

(三)路旁或耕地雜草

在海豐地區鄰近社區道路及廢耕農田部分，因人為干擾的效應嚴重，除農田邊緣木麻黃防風林帶外，喬木物種僅見少量銀合歡、構樹苗木著生的狀況，木麻黃純林周邊可見菊科鯽魚膽出現，區域內多為草本物種的先驅種類為主。

草本物種主要包括禾本科蘆葦、狗牙根、紅毛草、菊科大花咸豐草、豆科田菁，以禾本科佔有最大比例，其餘物種包括禾本科孟仁草、升馬唐、牛筋草、龍爪茅、甜根子草、狗尾草、

莧科野莧、藜科臭杏、蒺藜科蒺藜、莎草科密穗磚子苗、磚子苗、大戟科大飛揚、旋花科銳葉牽牛、馬鞭草科過江藤，另於道路邊緣地區則有馬齒莧科毛馬齒莧、爵床科小獅子草等草本植栽物種。

(四)濕生草澤

調查區域位居濱海地區有許多魚塭，周邊地區形成濕生草澤的植物形態。由於土壤受到鹽害，或因漁塭之內尚存有深淺不一的水漥，經由時間的演替，物種自由的入侵進駐，現多已形成草澤地。區域少見喬木物種，在人為干擾不嚴重的情況下，草本物種覆蓋度良好，僅有在季節上有物種消長的情形。

草本物種主要以禾本科之蘆葦及巴拉草為優勢物種，次生的木本植物如菊科鯽魚膽已經大量出現，在人為干擾地區則有禾本科雙穗雀稗、狗牙根、牛筋草、莎草科密穗磚子苗、磚子苗、乾溝飄拂草、番杏科濱馬齒，其餘物種包括菊科大花咸豐草、醴腸、禾本科孟仁草、紅毛草、象草、龍爪茅、甜根子草、豆科田菁、藜科臭杏，其上可見如桑科葎草、茜草科雞屎藤多種蔓性植物攀爬其上。

(五)填土區先驅植被

廠區之建築及設施目前已開始營運，少數空隙地仍殘留部分先驅植物社會。主要物種以旋花科馬鞍藤覆蓋面積最大，菊科大花咸豐草、禾本科牛筋草、旋花科菟絲子亦有大面積的生長，在裸露的地區已陸續可見禾本科孟仁草、龍爪茅、甜根子草、巴拉草、馬齒莧科馬齒莧、豆科田菁、大戟科台西大戟、藜科變葉藜等物種出現。

(六)旱作地

橋頭、麥寮及台西之間的旱作耕地，以農作物栽培為主。主要作物包括甘藷、金剛菜、白菜、花生、玉米、茭白筍、西

瓜、香瓜、蔥、蕃茄、芋、芹菜、茄子、青椒、蒜等。另外，下田洋以北的農田栽植甘蔗。

(七)水田

麥寮東北及濁水溪以北部份地方種植水稻。植被群落主要分佈在水稻田中之田埂上，常見上層植被主要為木麻黃、黃槿，並伴生有構樹、篳麻。因區域內人為干擾嚴重，草本物種不多，主要是菊科大花咸豐草、加拿大蓬、禾本科兩耳草、孟仁草、紅毛草、甜根子草、升馬唐等。

(八)行道樹及路旁喬灌木

本區域內行道樹植栽，仍以抗風耐鹽為主要考量，主要種植有木麻黃、黃槿、刺桐，路旁伴生有觀音竹、南美假櫻桃、構樹及篳麻等次生植栽。

3.2 建議事項

本季仍依循六輕開發案第四期環境影響評估定稿報告環境監測管理計畫內容持續進行監測，相關監測結果與數據分析情形詳如前述第二章與第三章節。本季監測期間(4月至6月)由於係屬春夏季，空氣品質監測中懸浮微粒測值受沙塵影響三測站均有異常測值發生。

由於六輕工業區位於離島式基礎工業區內，空氣品質監測結果僅在雲林離島式基礎工業區域內的部份監測情形。空氣品質監測數據情形由於受氣候與地域性影響較大，尚須整合範圍較大的離島式基礎工業區內各個監測站之數據，加以分析比較，所分析結果較能客觀展現出該地區之監測數據情形。建請離島式基礎工業區開發單位之監測結果也能參考六輕監測數據，若六輕所監測的數據有疏漏之處，可加以改進及增進數據可靠性。

[參考文獻]

- 1.環保署，雲林縣空氣品質改善/維護計畫之執行追蹤檢討，1996年6月。
- 2.雲林縣政府，雲林縣環境白皮書，1991年。
- 3.台塑石化股份有限公司，離島式基礎工業區石化工業綜合區第二期開發計劃環境影響評估報告，1992年9月。
- 4.李清勝，空氣品質監測與預報分析(二)---空氣品質潛勢預報分區，1993年。
- 5.柳中明，空氣品質監測與預報分析(二)---新舊測站資料銜接問題的分析探討，1993年。
- 6.林茂源，空氣品質監測站網數據品保系統之建立---資料確認標準研定，1993年。
- 7.環保署，二林、崙背、新港、台西、嘉義空氣品質自動連續測站之空氣品質數據，2001年。
- 8.台塑關係企業，離島式基礎工業區石化工業綜合區開發案環境監測報告，八十三年度第二季~九十七年度第一季。
- 9.台塑關係企業，離島式基礎工業區石化工業綜合區開發計畫環境影響評估報告，專題之二，環境現況調查（下），83年6月。
- 10.水污染防治法規，行政院環境保護署環境保護人員訓練所編印，95年10月。
- 11.噪音管制法規，行政院環境保護署環境保護人員訓練所編印，95年6月。
- 12.環境影響評估法規，行政院環境保護署環境保護人員訓練所編印，95年6月。

- 13.空氣污染防治法規，行政院環境保護署環境保護人員訓練所編印，95 年 10 月。
- 14.安藤義久，田村考廣，齊藤秀晴，野澤篤志，利用 CCD 照相機測地下水流速流向之適用性，日本水文、水資學會研究發表會要旨集，pp.196-199，1990。
- 15.Freeze, R. A. and J. A. Cherry, Groundwater, Prentice-Hall, New Jersey, 1979。
- 16.Mathess, G., The Properties of Groundwater, Wiley-Interscience Pub., 1982。
- 18.Pincus, L. I., Practical Boiler Water Treatment, McGraw-Hill, New York, 1962。
- 19.Scofield C. S., The Salinity of Irrigation Water, Smithsonian Report, 1935。
- 20.台灣漁業技術顧問社，興達海洋文化園區開發計畫規劃環境影響評估工作，民國八十四年。
- 12.王鑫，北海岸風景特定區生態資源調查，交通部觀光局，1982。
- 13.牟永平，臺灣的爬蟲類動物，動物園雜誌 14(1):28-37，1994。
- 14.牟永平、于名振、湯惟新，臺灣地區兩棲爬行類：研究資料庫，首屆海峽兩岸保護野生動物學術研討會論文集，東海大學環境科學研究中心，1992。
- 15.臺灣北海岸使用及環境保護之研究，行政院經建會住都處，1982
- 16.呂光洋、杜銘章、莊國碩、張寶連，臺灣沿海地區自然環境保護計劃，內政部營建署，1986。
- 17.呂光洋、夏復國，臺灣沿海地區自然環境保護之研究(後續計畫)海岸動物資源調查報告，內政部營建署，1984。

- 18.李培芬、梁世雄，動物生態評估技術之研究及評估模式之驗證，環保署，2002。
- 19.陳明義、沈競君、呂金誠、洪丁興、林信輝，臺灣沿海自然保護區之植物資源，內政部營建署，1986。
- 20.陳明義、洪丁興、沈秀雀、林信輝、林義軒，臺灣沿海地區自然環境保護之研究(後續計畫)海岸植物資源調查報告，內政部營建署，1984。
- 21.陳兼善，臺灣脊椎動物誌(上、中、下冊；于名振二次增訂)，臺灣商務印書館，1986。
- 22.陳維壽，臺灣的彩蝶，南天書局，1987。
- 23.章樂民，臺灣西海岸鹽濕地之植物地理與生態之研究，臺灣省林業試驗所報告第 213 號，1971。
- 24.第三次全省森林資源及土地利用調查，臺灣野生動物資源調查手冊(1.2.3.4.5.6)，行政院農業委員會，1990。
- 25.校園常見的昆蟲，臺灣省政府教育廳，1991。
- 26.國有林保育類野生動物及珍貴稀有植物圖鑑，臺灣省農林廳林務局，1992。
- 27.保育類野生動物圖鑑，臺灣省特有生物研究保中心，1996。
- 28.黃守光，臺灣之沙丘及植物社會，生物與環境專題研討會講稿集：109-117，1974。
- 29.黃增泉、吳俊宗、謝長富，環境響評估書格式及評估準則之建議—臺灣地區特稀有植物名錄，中華民國自然生態保育協會，1999。
- 30.楊平世，臺灣的常見昆蟲，渡假出版社，1985。
- 31.鈴木重良，臺灣海岸植物一覽，季節風調查會誌第一號別刷，1937。

- 32.臺灣野鳥資訊社，日本野鳥會，臺灣野鳥圖鑑，亞舍圖書，1991。
- 33.日本規格協會(JIS)，公害關係手冊，1996。
- 34.黃守光，台灣之沙丘及植物社會之生物與環境專題研討會講稿集，1974。
- 35.行政院環境保護署環檢所網站：www.niea.gov.tw/analysis/index
- 36.行政院環境保護署網站：www.epa.gov.tw
- 37.中興工程顧問公司，雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測九十七年度第二季，2008。